

Produktbeskrivelse

Medilax binder vand i tarmen og blødgør afføringen. Medilax kan anvendes mod kronisk forstoppelse. Kan også bruge Medilax til at forebygge og behandle hjernesvækkelse ved leversvigt.

Medilax bør ikke gives til børn under 2 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl, om du må bruge medicinen, bør du kontakte egen læge.

Dosering

▪ Den anbefalede dosis er:

1. Forstoppelse:
 - a. Børn under 5 måneder:
 - a. 3-6 ml daglig fordelt på 2 doser.
 - b. Børn 5-12 måneder:
 - 10 ml daglig fordelt på 1-2 doser.
 - c. Børn 1-14 år:
 - 5-15 ml daglig fordelt på 1-2 doser.
 - d. Opløsningen gives til barnets afføring er blevet normal, sædvanligvis 7-10 dage, hvorefter dosis aftrappes over de følgende uger.
 - e. Voksne og børn over 14 år:
 - Begyndelsesdosis 15-30 ml daglig.
 - a. Efter virkning er opnået, nedsættes dosis til det halve.
 - b. Hvis virkningen ikke indtræder i løbet af 3 dage, kan dosis fordobles.
 - c. Dosis er individuel og bør justeres til halvfast afføring opnås.
2. Til behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt:
 - Akut behandling:
 - o. Du begynder med at tage 50 ml hver 2. time, til du har haft 2 afføringer. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2-3 bløde afføringer dagligt. Det svarer normalt til, at du skal tage 30-50 ml 3 gange dagligt.
 - Kronisk behandling:
 - o. Du begynder med at tage 30-45 ml 3-4 gange dagligt. Derefter tilpasser du dosis, så du har 2-3 bløde afføringer dagligt.
3. Kan tages uafhængigt af måltiderne.
4. En dosis lactulose bør synkes på én gang og bør ikke holdes i munden i længere tid.
5. Under behandling med afføringsmidler anbefales det at drikke rigeligt med væske (1,5-2 liter, svarende til 6-8 glas) i løbet af dagen.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

▪ Tag ikke dette lægemiddel

1. Medilax hvis, du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof (lactulose) eller hjælpestoffet (vand, renset).

2. Hvis du lider af en medfødt arvelig stofskiftesygdom (Galaktosæmi), hvis din tarm er blokeret (passage stoppet) eller du får blindtarmsbetændelse eller du har mavesmerter af ukendte årsager.
- **Advarsler og forsigtighedsregler:**
 0. Du skal søge læge, hvis du ikke får effekt af Medilax inden for få dage.
 1. Høje doser (100–150 ml daglig) kan øge insulinbehovet hos diabetikere.
 2. Dette lægemiddel indeholder lactose, galactose og fructose. Hvis du lider af fructoseintolerans, galactoseintolerans/galaktosæmi, en særlig form for arvelig lactasemangel eller glucose/galactose-malabsorption (GGM) eller hvis du lider af gastro-kardielt syndrom (Roemhelds syndrom) bør du ikke anvende Medilax uden aftale med lægen.
 3. Dette lægemiddel indeholder sulfid. Kan i sjældne tilfælde medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.
 - **Brug af anden medicin:**
 0. Tal med lægen hvis du bruger vanddrivende midler (diuretika), digoxin (hjertemedicin), binyrebarkhormoner (hydrocortison, prednison m.v.) eller svampemidlet amphotericin B, da effekten kan blive påvirket.
 - **Graviditet og amning:**
 0. Kan anvendes.
 - **Trafik- og arbejdssikkerhed:**
 0. Kan anvendes.
 - **Overdosering:**
 0. Symptomer: Diarré, elektrolyttab.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

- **De mulige bivirkninger som du kan opleve er:**
1. Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):
 - a. Lette mavesmerter, oppustet mave og afgang af luft fra tarmen.
 2. Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):
 - Kvalme, opkastning og diarré ved høje doser.
 3. Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): Elektrolytubalance på grund af diarré.
 4. Sjældne bivirkninger: (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter). Forhøjet natriumindhold i blodet ved behandling af hjernesvækkelse ved leversvigt.

Opbevaring og holdbarhed

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.
- Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Sidst opdateret d. 25/11-2020