

## Produktbeskrivelse

Du kan bruge Glyoktyl rektalvæske ved forstoppelse og til at tømme tarmen før operation og undersøgelser af tarmen.

Bør ikke gives til børn under 2 år uden lægens anvisning.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl, om du må bruge medicinen, bør du kontakte egen læge.

## Dosering

- **Den anbefalede dosis er:**

1. Voksne og børn:

- a. 7,5 ml (1 sprøjte) ad gangen.

- b. Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

2. Indgivelsesmåde:

- . Tubespidsen indføres i hele sin længde i endetarmen.

- a. For børn under 3 år indføres dog højst den halve længde af tubens spids. Der trykkes med konstant tryk, indtil beholderen næsten er tømt. Tuben fjernes, mens den fortsat holdes sammenklemmt.

## Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

- **Tag ikke dette lægemiddel:**

1. Hvis du er overfølsom (allergisk) over for det virksomme stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (se indlægssedlen for informationer).

2. Hvis du lider af manglende passage i tarmen, f.eks. tarmslyng eller forsnævring af tarmen.

3. Du har smerter i maven af ukendt årsag.

- **Vær forsigtig:**

0. Du må kun bruge Glyoktyl i kort tid. Hvis du bruger Glyoktyl i længere tid, kan du komme til at lide af mangel på vand og salte.

1. Hvis du dagligt har brug for et afføringsmiddel, skal du tale med lægen.

2. Forsigtighed udvises hvis du har hæmorroider eller rifter ved endetarmen.

3. Du må ikke anvende afføringsmidler, der indføres i endetarmen, hvis du har blødninger eller betændelse i tarmen.

- **Brug af anden medicin:**

0. Hvis du tager andre afføringsmidler, skal dosis af denne måske nedsættes. Tal med lægen.

- **Graviditet og amning:**

0. Hvis du er gravid skal du normalt ikke bruge medicin uden aftale med din læge. Glyoktyl kan anvendes ifølge aftale med lægen.

1. Glyoktyl kan anvendes i ammeperioden.

- **Trafik- og arbejdssikkerhed:**

0. Ingen mærkning.

- **Overdosering:**

0. Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering.

## Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

- **De mulige bivirkninger som du kan opleve er:**
- 1. Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 0,001-0,01% behandlede):
  - a. Nældefeber, allergisk reaktion.
  - 2. Ikke kendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):
    - Elektrolyttab (ændringer i væskebalancen), Irritation i endetarmen. Smerter og blødning fra endetarmen. Smerter i maven, utilpashed.

## Opbevaring og holdbarhed

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares over 25°C.
- Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Sidst opdateret d. 19/07-2021.