

Produktbeskrivelse

Ipren tilhører gruppen af NSAID (non-steroid antiinflammatoriske stoffer) og anvendes ved svage smerter.

I pakningerne med medicin findes en patientvejledning, som du altid bør læse grundigt, inden du tager medicinen. Hvis du er i tvivl, om du må bruge medicinen, bør du kontakte egen læge.

Dosering

▪ Den anbefalede dosis er:

1. Voksne:
 - a. 1-2 tabletter, højst 6 tabletter i døgnet.
 2. Ipren bør ikke gives til børn under 15 år uden lægens anvisning.
 3. Dosisreduktion er ikke nødvendigt for ældre eller personer med nedsat lever- eller nyrefunktion, men Ipren bør anvendes med forsigtighed. Spørg evt. lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

De vigtigste advarsler og forholdsregler som du skal være opmærksom på er nævnt her. For yderligere information henvises til indlægssedlen som du finder i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

▪ Tag ikke dette lægemiddel:

1. Tag ikke Ipren hvis:
 - a. Du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof (ibuprofen) eller et af de øvrige indholdsstoffer (Croscarmellose natrium (E 468), hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520), talcum (E 553b), vandfri kolloid silica (E 551))
 - b. Har svært nedsat hjerte-, nyre eller leverfunktion.
 - c. Tidligere har haft blødning eller hul i mave-tarm kanalen i forbindelse med behandling med smertestillende medicin (NSAID).
 - d. Har aktivt eller tilbagevendende blødende tyktarmsbetændelse, Crohns sygdom, mavesår eller blødning fra mave-tarm kanalen.
 - e. Har mavesår eller sår på tolvfingertarmen.
 - f. Tidligere har haft astma eller astmalignende anfald, hævelser i hud og slimhinder, nældefeber eller snue udløst af acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID).
 - g. Har tendens til blødninger.
 - h. Er gravid i 7. - 9. måned.

▪ Særlige advarsler og forsigtighedsregler:

- o. Kontakt lægen før du tager Ipren, hvis du
 - . Har astma.
 - a. Har nedsat nyre- eller leverfunktion.
 - b. Er barn eller ung og/eller er dehydreret, da der er risiko for nedsat nyrefunktion.
 - c. Er ældre, da ældre har større risiko for at få bivirkninger, særligt mavesår og blødning fra mave-tarmkanalen.

- d. Har haft en tarmsygdom (betændelse i tynd- eller tyktarm).
 - e. Har hjerteproblemer, har fået foretaget en bypassoperation, har, eller har haft dårligt blodomløb i benene eller fødderne eller har haft nogen form for slagtilfælde.
 - f. Har forhøjet blodtryk, sukkersyge eller forhøjet kolesterol eller hvis du er ryger.
 - g. Tidligere har haft mavesår.
1. eller
 - . Hvis du får mavesår eller blødning fra mave-tarmkanalen, mens du er i behandling med Ipren.
 - a. Hvis din hovedpine bliver værre. (Ved længere tids brug af Ipren kan hovedpine blive værre og opstå hyppigere).
 - b. Hvis du får udslæt, slimhindesår eller anden overfølsomhedsreaktion.
 - c. Hvis du får hovedpine, rygsmerte, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløvhed og evt. feber (Ipren kan maskere infektioner).
 - d. Hvis du får skoldkopper imens du tager Ipren skal du kontakte lægen, da det kan medføre alvorlige infektioner.
 - e. Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner ved behandling med Ipren. Du bør stoppe med at tage Ipren og straks søge læge, hvis du får hududslæt, læsioner i slimhinderne, blærer eller andre tegn på allergi, da dette kan være de første tegn på en meget alvorlig hudreaktion.
 - f. I meget sjældne tilfælde kan der opstå pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Det kan være livsfarligt. Ring derfor 112.
 2. For at minimere bivirkninger behandles i så kort tid og med så lav dosis som muligt.
 3. Hvis du ønsker at blive gravid, skal du stoppe med at tage Ipren da de kan nedsætte evnen til at blive gravid.
 4. Ipren virker febernedsættende og kan forlænge blødningstiden (blodets evne til at størkne).

▪ **Brug af anden medicin:**

0. Ipren kan påvirke eller blive påvirket af visse andre lægemidler. For eksempel:
 - . Blodfortyndende lægemidler (f.eks. acetylsalicylsyre, warfarin, ticlopidin).
 - a. Lægemidler, som nedsætter et forhøjet blodtryk (f.eks. captopril, atenolol, losartan).
 - b. Vanddrivende medicin (diuretika).
 - c. Hormoner (kortikosteroider).
 - d. Lægemidler af samme gruppe som ibuprofen (NSAID) f.eks. acetylsalicylsyre.
 - e. Digoxin (for hjertet).
 - f. Lithium (mod sindslidelse).
 - g. Ciclosporin, tacrolimus (undertrykker immunforsvaret).
 - h. Middel mod infektion, f.eks. ciprofloxacin, norfloxacin eller aminoglycosider.
 - i. SSRI (antidepressive midler).
 - j. Ginko biloba (naturlægemiddel).
 - k. Andre lægemidler, f.eks. voriconazol, fluconazol, methotrexat eller Zidovudin.
1. Visse andre lægemidler kan også påvirke eller blive påvirket af behandlingen med Ipren. Du bør altid spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager Ipren sammen med andre lægemidler.

- **Mad og drikke:**
 0. Ipren kan tages uafhængigt af måltiderne.
- **Graviditet, amning og fertilitet:**
 0. Fertilitet: bør ikke anvendes, da denne type medicin menes at kunne nedsætte evnen til at blive gravid.
 1. Graviditet: Du kan tage Ipren efter aftale med lægen. Du må ikke tage Ipren hvis du er gravid i 7. til 9. måned.
 2. Amning: Kan anvendes. Tal med lægen inden du tager medicin, hvis du ammer.
- **Trafik- og arbejdssikkerhed:**
 0. Vær opmærksom på, at Ipren især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis kan give bivirkninger som svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
- **Overdosering:**
 0. Symptomer:
 - Mavesmerter, kvalme, opkastning, ekstrem træthed og sløvhed, svimmelhed, hovedpine, tinnitus, manglende koordinering af bevægelser, koma og kramper, for meget syre i blodet, vejrtrækningsbesvær, påvirkning af leverfunktionen, forhøjet natrium i blodet, nyresvigt og blod i urinen, påvirkning af hjerte-karsystemet med for lavt blodtryk og ændret hjerterytme. Ved alvorlig forgiftning er symptomerne kvalme og opkastning på grund af for meget syre i blodet.
 1. Kontakt lægen eller skadestuen - tag pakningen med.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

For yderligere information om mulige bivirkninger henvises du til indlægssedlen i pakningen eller produktresumé nederst på denne side.

- **De mulige bivirkninger som du kan opleve er:**
 1. Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):
 - a. Smerter fra den øvre mave-tarm kanal, diarre, blødning fra mave-tarm kanalen, blodig opkastning, blodig afføring, mavesmerter, luft i tarmene og træthed.
 2. Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):
 - Hovedpine, svimmelhed, tinnitus, kvalme, smerter fra maven, ubehag, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekramper, udslæt og væskeophobning i kroppen.
 3. Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):
 - Hjertesvigt, som kan medføre åndenød, hoste, trykken for brystet, hurtig puls og væske i benene. Sløvhed, træthed, bleghed, blødninger, blå mærker samt tendens til infektioner, alvorlig blodmangel, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, synsforstyrrelser, påvirkning af hørelsen, forværring af astma, sår eller blødning i mave-tarmkanalen,

- betændelse i tyktarmen, inflammatoriske tarmsygdomme, sår på slimhinderne i munden, betændelse i maveslimhinden, halsbrand, akut nedsat nyrefunktion, betændelse i nyrerne, nældefeber, kløe, rødfarvning af huden, øget hudfølsomhed overfor lys, snue, forhøjet blodtryk, anafylaktiske reaktioner og leverpåvirkning, gulsot, svært forhøjede levertal. Hallucinationer, søvnløshed, nervøsitet og mild rastløshed.
4. Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter):
 - . Betændelse i synsnerven, betændt udslæt, nakkestivhed, hovedpine, kvalme, opkastning, feber, desorientering som følge af meningitis, kulderystelser, feber på grund af overfølsomhed overfor ibuprofen, depression, forvirring, koncentrationsbesvær og besvær med at reagere normalt.
 5. Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):
 - . Forværring af akut åndenød, betændelse i bugspytkirtlen, forværring af betændelse i tyktarmen eller Crohns sygdom, nedsat udskillelse af urinstof, kraftig afskalning og afstødning af hud, blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber, forværring af infektion, betændelse i blodkarrene som kan medføre feber og utilpashed og anafylaktisk shock.
 6. Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (Kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):
 - . Forværring af infektionsrelaterede betændelsestilstande (nekrotiserende fasciitis) og inflammatorisk tilstand i spiserøret.
 - a. Et stort, rødt og skællende udslæt med knuder under huden og blæredannelse, primært i hudfolder, på kroppen og på armene og ledsaget af feber i begyndelsen af behandlingen (akut generaliseret eksantematøs pustulose). Hold op med at bruge Ipren, hvis du udvikler disse symptomer, og søg læge med det samme.

Opbevaring og holdbarhed

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug ikke produktet efter den udløbsdato, der står på pakningen.
- Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Sidst opdateret d. 08/04-2020