3M™ Tegaderm™ + Pad
Film Dressing with Non-Adherent Pad

GB English

Description:
This 3M™ Tegaderm™ +Pad Film Dressing with Non-Adherent Pad is waterproof, bacterial and viral* barrier dressing. The dressing consists of a non-adherent, absorbent pad bonded to a larger thin film backing with a non-latex, hypoallergenic adhesive.
*In vitro testing shows that the transparent film dressing provides a viral barrier from viruses 27 nm in diameter or larger while the dressing remains intact without leakage.

Indications:
This 3M™ Tegaderm™ +Pad Film Dressing with Non-Adherent Pad is designed for covering acute wounds such as cuts, superficial and partial- thickness burns, abrasions, IV catheter sites, and surgical incisions. It is also designed for covering low exuding superficial and partial- thickness chronic wounds including pressure ulcers, venous ulcers and diabetic foot ulcers. Follow your "gauze and tape" protocol for use. This product is not designed, sold or intended for use except as indicated.

Contraindications:
None known.

Warnings:
Do not use the dressing as a replacement for sutures and other primary wound closure methods.

Precautions:
1. Stop any bleeding at the site before applying the dressing.
2. Do not stretch the dressing during application as tension can cause skin trauma.
3. Make sure the skin is dry and free of soap residue and lotion to prevent skin irritation and to ensure good adhesion.
4. The dressing may be used on an infected site only when under the care of a health care professional.

Instructions for use:

Dressing selection:
Choose a dressing size large enough to provide a margin that adheres to dry healthy skin around the catheter or wound site.

Site preparation:
1. Prepare the site according to institution protocol.
2. Clipping of hair at the site may improve adhesion. Shaving is not recommended.
3. Allow all prep liquids to completely dry before applying the dressing to prevent skin irritation and ensure good adhesion.

Application:
1. Préparer le site conformément au protocole de l'établissement.
2. La tonte des poils présents sur le site d'application peut améliorer l'adhérence. Néanmoins, il n'est pas recommandé de raser cette zone.
3. Laisser sécher complètement tout antiseptique avant d'appliquer le pansement afin d'éviter une irritation cutanée et assurer une bonne adhésivité.

Application :
1. Ouvrir le sachet et en retirer le pansement stérile.
2. Retirer le support papier en-dessous du pansement afin d'exposer la surface adhésive.
3. Mettre en place le pansement en centrant la fenêtre encadrée sur la plaie ou le site d'insertion du cathéter.
4. Appliquer le pansement en appuyant.
5. Retirer le cadre de pose en papier du pansement tout en lissant bien les bords. Assurer l'adhérence du pansement autour de cathéter ou de la plaie. Bien lisser le pansement en pressant les bords adhésifs sur la peau.

Soins du site d'application :
1. Surveiller le site pour détecter tout signe d'infection ou autre complication. En cas de soupçons d'infection, retirer le pansement, examiner directement le site et déterminer l'intervention médicale appropriée. Une infection peut se signaler par un accès de fièvre, une douleur, une rougeur, un gonflement, une odeur ou une suppuration inhabituelle.
2. Changer le pansement conformément au protocole en vigueur dans l'établissement ou dès que ses propriétés protectrices ont été compromises.

Retrait du pansement :
Saisir délicatement un bord du pansement et le décoller doucement en tirant tangentiellement à la peau, dans le sens de la pousse des poils. Pour éviter toute lésion cutanée, tirer le pansement en le tirant vers l'arrière plutôt que vers le haut.

Conditions et durée de conservation :
Pour des résultats optimaux, conserver le produit dans un endroit frais et sec. Pour connaître la durée de conservation du produit, consulter la date d'expiration sur l'emballage.

Conditionnement et informations commandes :
Distribué en boîtes contenant des pansements stériles emballés individuellement. La stérilité du pansement est garantie, sauf si l'emballage individuel est ouvert ou endommagé. Si vous avez des questions ou des remarques, veuillez contacter notre Centre Information Client de 3M Santé en France au 1 800 228 3957.
Si vous souhaitez des informations supplémentaires en dehors des Etats-Unis, veuillez joindre votre représentant 3M local ou contacter-nous sur www.3M.com et sélectionner votre pays.

Explication des symboles :

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert. | Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel. | Attention ou mises en garde importantes. | Stérilisé par irradiation | Ne pas réutiliser | Date de péremption | LOT Numéro de lot | Fabricant

Made in Germany by
3M Health Care
2910 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 U.S.A.
(U.S.A.) 1-800-228-3957
3M.com/Tegaderm
Patent: 3M.com/Patents

CE 0086

© 2014, 3M. All rights reserved.
3M and Tegaderm
are Trademarks of 3M

Date of issue: 2014-07

EC REP
3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany

3M™ Tegaderm™ + Pad
Pansement film avec compresse non adhérente

FR Français

Description :
Le pansement transparent 3M™ Tegaderm™ + Pad avec compresse non adhésive est une barrière antibactérienne et antivirale* résistante à l'eau. Ce pansement est constitué d'une compresse absorbante non adhésive centrée sur un film transparent débordant sur les 4 côtés de la compresse, ceduit d'un adhésif hypoallergénique sans latex.
*Des tests in vitro ont montré que le film transparent des pansements constitue une barrière virale pour des virus d'un diamètre de 27 nm ou plus, à condition que le pansement demeure intact et qu'il n'y ait pas de fuites.

Indications :
Le pansement 3M™ Tegaderm™ + Pad avec compresse non adhésive est indiqué pour couvrir les plaies aiguës, telles que les coupures, les brûlures superficielles à peu profondes, les abrasions, les sites de pose de cathéters intraveineux ou les incisions chirurgicales. Il est également indiqué pour couvrir les plaies chroniques superficielles et peu profondes comme les escarres, les ulcères veineux et les ulcères de pied diabétique. A utiliser suivant le protocole d'application des « pansements secs –de votre établissement. Ce produit a été conçu pour être vendu et utilisé aux seules fins indiquées.

Contre-indications :
Aucune mise en garde connue.

Avertissements :
Ne pas utiliser le pansement en remplacement de sutures ou d'autres méthodes de sutures primaires des plaies.

Précautions :
1. Assurer une hémostase complète de la plaie avant d'appliquer le pansement.
2. Ne pas étirer le pansement pendant l'application car cela pourrait créer une lésion cutanée.
3. S'assurer que la peau est propre, sèche et dépourvue de résidus de savon et d'autres substances de nettoyage pour éviter une irritation cutanée et garantir une bonne adhésivité.
4. N'utiliser le pansement sur une plaie infectée que sous la supervision d'un professionnel de santé.

Mode d'emploi :

Choix du pansement :
Choisir un pansement suffisamment grand pour que le bord adhésif du pansement soit en contact avec la peau sèche et saine entourant la plaie ou le site de pose du cathéter.

Préparation du site :
1. Préparer le site conformément au protocole de l'établissement.
2. La tonte des poils présents sur le site d'application peut améliorer l'adhérence. Néanmoins, il n'est pas recommandé de raser cette zone.
3. Laisser sécher complètement tout antiseptique avant d'appliquer le pansement afin d'éviter une irritation cutanée et assurer une bonne adhésivité.

Application :
1. Ouvrir le sachet et en retirer le pansement stérile.
2. Retirer le support papier en-dessous du pansement afin d'exposer la surface adhésive.
3. Mettre en place le pansement en centrant la fenêtre encadrée sur la plaie ou le site d'insertion du cathéter.
4. Appliquer le pansement en appuyant.
5. Retirer le cadre de pose en papier du pansement tout en lissant bien les bords. Assurer l'adhérence du pansement autour du cathéter ou de la plaie. Bien lisser le pansement en pressant les bords adhésifs sur la peau.

Soins du site d'application :
1. Surveiller le site pour détecter tout signe d'infection ou autre complication. En cas de soupçons d'infection, retirer le pansement, examiner directement le site et déterminer l'intervention médicale appropriée. Une infection peut se signaler par un accès de fièvre, une douleur, une rougeur, un gonflement, une odeur ou une suppuration inhabituelle.
2. Changer le pansement conformément au protocole en vigueur dans l'établissement ou dès que ses propriétés protectrices ont été compromises.

Retrait du pansement :
Saisir délicatement un bord du pansement et le décoller doucement en tirant tangentiellement à la peau, dans le sens de la pousse des poils. Pour éviter toute lésion cutanée, tirer le pansement en le tirant vers l'arrière plutôt que vers le haut.

Conditions et durée de conservation :
Pour des résultats optimaux, conserver le produit dans un endroit frais et sec. Pour connaître la durée de conservation du produit, consulter la date d'expiration sur l'emballage.

Conditionnement et informations commandes :
Distribué en boîtes contenant des pansements stériles emballés individuellement. La stérilité du pansement est garantie, sauf si l'emballage individuel est ouvert ou endommagé. Si vous avez des questions ou des remarques, veuillez contacter notre Centre Information Client de 3M Santé en France au 1 800 228 3957.
Si vous souhaitez des informations supplémentaires en dehors des Etats-Unis, veuillez joindre votre représentant 3M local ou contacter-nous sur www.3M.com et sélectionner votre pays.

Explication des symboles :

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert. | Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel. | Attention ou mises en garde importantes. | Stérilisé par irradiation | Ne pas réutiliser | Date de péremption | LOT Numéro de lot | Fabricant

Made in Germany by
3M Health Care
2910 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 U.S.A.
(U.S.A.) 1-800-228-3957
3M.com/Tegaderm
Patent: 3M.com/Patents

CE 0086

© 2014, 3M. All rights reserved.
3M and Tegaderm
are Trademarks of 3M

Date of issue: 2014-07

EC REP
3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany

3M™ Tegaderm™ + Pad
Filmverband mit nicht haftender Wundauflage

DE Deutsch

Beschreibung:
Der 3M™ Tegaderm™ + Pad Filmverband mit nicht haftender Wundauflage ist ein wasserfester, bakterien- und virendichter* Wundverband. Der Verband besteht aus einer nicht haftenden, absorptionsfähigen Wundauflage auf einer größeren dünnen Filmmembran, die mit einem hypoallergenen, latexfreien Klebstoff beschichtet ist.
*In-vitro-Tests haben bewiesen, dass der transparente Film des Verbandes eine Barriere gegen Viren mit einer Größe von 27 nm oder größer bildet, solange der Verband intakt bleibt und keine Flüssigkeit austritt.

Indikationen:
Der 3M™ Tegaderm™ + Pad Filmverband mit nicht haftender Wundauflage ist für die Abdeckung von akuten Wunden, wie z. B. Schnittwunden, oberflächliche Verbrennungen und Verbrennungen zweiten Grades, Abschürfungen, IV-Kathetereinstichstellen und chirurgische Wunden vorgesehen. Er ist auch für die Versorgung wenig exsudierender oberflächlicher bis mäßig tiefer chronischer Wunden geeignet, einschließlich Druckulcera, venöser Ulcera und diabetischer Fußulcera. Folgen Sie den üblichen Behandlungsstandards. Das Produkt ist nur für den angegeben Einsatz bestimmt und wird ausschließlich zu diesem Zweck verkauft.

Kontraindikationen:
Keine bekannt.

Warnhinweise:
Der Verband darf nicht als Ersatz für Wundnähte oder andere primäre Wundverschlussmethoden benutzt werden.

Vorsichtshinweise:
1. Vor der Applikation müssen eventuelle Blutungen gestoppt sein.
2. Überdehnen Sie den Verband nicht bei der Applikation, da sonst Hautschädigungen entstehen können.
3. Achten Sie darauf, dass die Haut trocken und frei von Seifen- und Lotionsresten ist, um Hautirritationen vorzubeugen und eine gute Haftung zu gewährleisten.
4. Der Verband darf auf infizierten Stellen nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden.

Anwendungshinweise:

Auswahl des Verbandes:
Wählen Sie die Verbandgröße so aus, dass ausreichend Klebefläche für den Halt auf der gesunden und trockenen Haut um die Wund- bzw. Kathetereinstichstelle herum vorhanden ist.

Vorbereitung der Einstichstelle:
1. Bereiten Sie die Einstichstelle gemäß Ihren internen Pflegestandards vor.
2. Das Zurückschneiden der Haare um die Kathetereinstichstelle bzw. Wunde verbessert die Haftung des Verbandes. Rasieren ist nicht zu empfehlen.
3. Lassen Sie vor dem Anlegen des Verbandes alle aufgebrachten Desinfektionsmittel und Lösungen vollständig abtrocknen, um Hautreizungen zu vermeiden und eine gute Haftung zu gewährleisten.

Applikation:
1. Öffnen Sie die Packung und entnehmen Sie den sterilen Verband.
2. Entfernen Sie das Trägerpapier vom Verband mit Papierlaschen, ohne mit der Wundauflage und dem Wundrand in Berührung zu kommen.
3. Positionieren Sie den eingerahmten Ausschnitt über der Kathetereinstichstelle oder Wunde und applizieren Sie den Verband.
4. Drücken Sie den Verband an.
5. Entfernen Sie den Papierrahmen vom Verband, während Sie dabei die Verbandränder glattstreichen. Modellieren Sie gut und sicher am Katheter oder an der Wunde an. Drücken Sie den Kleberand gut an.

Pflege der Punktionsstelle/Wunde:
1. Die Punktionsstelle bzw. Wunde sollte regelmäßig auf Infektionszeichen oder andere Komplikationen untersucht werden. Bei Verdacht einer Infektion sollten Sie den Verband entfernen, die Wunde direkt begutachten und die entsprechenden Gegenmaßnahmen veranlassen. Infektionen können angezeigt werden durch Fieber, Schmerzen, Rötung, Schwellung, auffälligen Geruch oder Ausfluss.
2. Wechseln Sie den Verband entsprechend internen Pflegestandards oder bei Bedarf.

Entfernungshinweise:
Lösen Sie vorsichtig eine Ecke des Verbandes und ziehen sie ihn langsam in Haarwuchsrichtung von der Haut ab. Indem Sie den Verband flach zurückziehen anstatt ihn von der Haut hoch zu ziehen, vermeiden Sie Hautverletzungen.

Lagerung und Haltbarkeit:
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Das Verfallsdatum ist auf jeder Verpackung aufgedruckt.

Art der Verpackung und Angaben zur Bestellung:
Das Produkt wird in Schachteln mit einzeln verpackten, sterilen Verbänden geliefert. Die Sterilität des Filmverbandes wird bei unversehrter und ungeöffneter Packung garantiert. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Medica Fachhändler vor Ort.
Weitere Informationen außerhalb der USA erhalten Sie von Ihrem 3M-Vertreter vor Ort oder kontaktieren Sie uns unter www.3M.com. Wählen Sie dann Ihr Land aus.

Erklärung der Symbole:

Bei beschädigter oder geöffneter Verpackung nicht verwenden. | Nicht mit Naturkautschuklatex verfertigt. | Achtung, bitte Gebrauchsanleitung beachten! | STERILE R Durch Bestrahlung sterilisiert | Nicht zur Wiederverwendung | Hafttabelle/Lasche | LOT Chargencode | Hersteller

DV-1563-0024-1/0716

3M™ Tegaderm™ + Pad
Medicazione in film con tampone non aderente

IT Italiano

Descrizione:
La medicazione in film 3M™ Tegaderm™ + Pad con tampone non aderente è impermeabile e agisce come barriera antibatterica e antivirale*. La medicazione è costituita da un tampone assorbente non aderente coperto da un film sottile, di dimensioni maggiori, con un adesivo ipoallergenico privo di lattice.
*I test in vitro mostrano che il rivestimento in film di poliuretano rappresenta un'efficace barriera ai virus di 27 nm di diametro o superiore, se la medicazione resta intatta senza perdite.

Indicazioni:
La medicazione in film 3M™ Tegaderm™ + Pad con tampone non aderente è indicata per la copertura di ferite acute, come tagli, ustioni superficiali e a spessore parziale, abrasioni, siti di cateterizzazione endovenosa e ferite chirurgiche. È inoltre indicata per coprire ferite croniche superficiali e a spessore parziale lievemente essudanti, incluse piaghe da decubito, ulcere venose e ulcere del piede diabetico. Per l'uso, attenersi al protocollo di medicazione vigente. Questo prodotto non è ideato, venduto o inteso per usi diversi da quelli espressamente indicati.

Controindicazioni:
Nessuna nota.

Avvertenze:
Non utilizzare la medicazione in sostituzione di suture o altri metodi di chiusura primaria delle ferite.

Precauzioni:
1. Prima di applicare la medicazione, arrestare l'eventuale sanguinamento del sito.
2. Non tendere la medicazione durante l'applicazione, in quanto la tensione potrebbe causare traumi alla cute.
3. Accertarsi che la cute sia asciutta e priva di residui di sapone o lozioni per evitare irritazioni e garantire una buona adesione.
4. La medicazione può essere utilizzata su un sito infetto solo sotto la diretta osservazione di personale sanitario.

Istruzioni per l'uso:

Scelta della medicazione:
Scegliere una misura sufficiente a fornire un margine che aderisca alla cute sana e asciutta attorno al catetere o al sito della lesione.

Preparazione del sito:
1. Preparare il sito secondo la procedura in uso.
2. La tricotomia del sito può migliorare l'adesione della medicazione. Si sconsiglia di depilare la cute con un rasoio.
3. Per evitare l'irritazione della cute e per garantire un'adesione adeguata, lasciare asciugare completamente tutti i liquidi di preparazione prima di procedere all'applicazione della medicazione.

Applicazione:
1. Aprire la confezione ed estrarre la medicazione sterile.
2. Staccare la striscia di carta protettiva dalla porzione di medicazione con cornice di carta, in modo da esporre la superficie adesiva.
3. Centrare la finestra a cornice sul sito di inserzione del catetere o sulla ferita e applicare la medicazione.
4. Premere la medicazione in posizione.
5. Rimuovere la cornice di carta dalla medicazione e fare aderire i bordi. Far aderire bene la medicazione attorno alla ferita o al sito di cateterizzazione. Applicare una pressione sui bordi per migliorare l'adesione alla cute.

Gestione del sito di applicazione:
1. Il sito deve essere osservato per rilevare eventuali segni di infezione o altre complicanze. Se si sospetta la presenza di un'infezione, rimuovere la medicazione, esaminare accuratamente il sito e determinare gli opportuni interventi medici di trattamento. I sintomi di infezione possono includere febbre, dolore, arrossamento, gonfiore, ragguo odore o secrezioni insolite.
2. La medicazione va cambiata in base alla procedura in uso o quando le sue proprietà di protezione risultano compromesse.

Rimozione della medicazione:
Sollevare delicatamente il bordo della medicazione e staccarla lentamente dalla cute nella direzione della crescita dei peli. La medicazione deve essere staccata ripiegandola su se stessa in senso orizzontale, non tirandola verso l'alto, al fine di ridurre i traumi alla cute.

Conservazione e scadenza:
Per ottenere risultati ottimali, conservare in un luogo fresco e asciutto. Per la durata del prodotto, fare riferimento alla data di scadenza riportata su ciascuna confezione.

Confezionamento e informazioni per gli ordini:
Il prodotto è fornito in scatole contenenti medicazioni sterili confezionate singolarmente. La sterilità della medicazione è garantita, purché la singola confezione non sia stata aperta o danneggiata. Per eventuali domande o commenti, negli Stati Uniti contattare la linea diretta dell'assistenza clienti 3M Health Care al numero 1-800-228-3957.
Per ulteriori informazioni al di fuori degli Stati Uniti, contattare il rappresentante locale 3M o visitare il sito web www.3M.com dopo aver selezionato il proprio Paese.

Descrizione dei simboli:

Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta. | Non realizzato con lattice di gomma naturale | Attenzione/istruzioni sulle avvertenze importanti | STERILE R Sterilizzato per irradiazione | Monouso | Data di scadenza | LOT Codice di lotto | Produttore

3M™ Tegaderm™ + Pad
Apósito transparente con almohadilla antiadherente

ES Español

Descripción:
El apósito transparente 3M™ Tegaderm™ + Pad es impermeable y sirve de barrera para bacterias y virus*. El apósito se compone de una película delgada de cobertura más grande con adhesivo hipoalergénico sin látex y una almohadilla absorbente no adherente.
*Las pruebas in vitro muestran que los apósitos transparentes brindan una barrera contra los virus de 27 nm de diámetro o más siempre que el apósito se mantenga intacto y sin pérdidas.

Indicaciones:
El apósito transparente 3M™ Tegaderm ™ + Pad con almohadilla no adherente está diseñado para cubrir heridas agudas tales como cortes, quemaduras superficiales y de espesor parcial, abrasiones, puntos de punción de catéteres IV e incisiones quirúrgicas. También está diseñado para cubrir heridas crónicas superficiales y de espesor parcial con bajo nivel de exudado, incluso úlceras de presión, úlceras venosas y úlceras de pie diabético. Se deben utilizar siguiendo las indicaciones del protocolo de uso de apósitos de gasa y esparadrapo. Este producto no está diseñado para venderse o utilizarse para un uso diferente al expresamente indicado.

Contraindicaciones:
Ninguna conocida.

Advertencias:
No utilizar el apósito como sustituto de suturas ni otros métodos primarios de cierre de heridas.

Precauciones:
1. Detenga cualquier hemorragia en el punto de punción antes de aplicar el apósito.
2. No estire el apósito durante la aplicación, ya que la tensión podría causar lesiones en la piel.
3. Asegúrese de que la piel está seca y sin residuos de jabón o cremas para prevenir la irritación de la piel y asegurar una buena adhesión
4. El apósito puede utilizarse en una zona infectada solo bajo la supervisión de un profesional sanitario.

Instrucciones de uso:

Selección del apósito:
Seleccione un apósito de tamaño suficiente para permitir que haya un margen mínimo que cubra la piel sana alrededor de la herida o del punto de punción.

Preparación de la zona:
1. Prepare la zona de acuerdo con el protocolo de la institución.
2. Rasurar el vello de la zona puede mejorar la adhesión. No se recomienda afeitar con cuchilla la zona.
3. Permita que todos los líquidos de preparación se sequen completamente antes de aplicar el apósito para prevenir la irritación de la piel y asegurar una buena adhesión.

Aplicación:
1. Abra el paquete y saque el apósito estéril.
2. Despegue el soporte protector de papel del apósito, dejando al descubierto la cara interna adhesiva.
3. Coloque la ventana enmarcada sobre la zona de la herida o el punto de inserción del catéter y aplique el apósito.
4. Presione el apósito en su lugar.
5. Retire el marco de aplicación del apósito mientras alisa los bordes del apósito hacia abajo. Selle con seguridad alrededor del catéter o la herida. Alise firmemente los bordes adhesivos a la piel.

Cuidados de la zona:
1. La zona debe examinarse en busca de signos de infección u otras complicaciones. En caso de una posible infección, retire el apósito, revise la zona directamente y determine la intervención médica adecuada. Una infección puede advertirse por la aparición de fiebre, dolor, enrojecimiento, hinchazón, a un olor o exudado no usuales.
2. Cambie el apósito según el protocolo de la institución o cuando las propiedades de barrera se vean comprometidas

Retirada del apósito:
Sujete el apósito suavemente por uno de sus bordes y despéguelo lentamente de la piel en dirección al crecimiento del vello. Evite lesiones en la piel despegando el apósito hacia atrás en lugar de hacia arriba.

Almacenamiento y vida útil:
Para obtener resultados óptimos, conserve en un lugar fresco y seco. Para obtener información acerca de la vida útil, consulte la fecha de caducidad impresa en cada paquete.

Información sobre presentación y pedidos:
Se comercializa en cajas de apósitos estériles envasados individualmente. La esterilidad del apósito está garantizada siempre que el envase individual no esté dañado o abierto. Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con el Centro de Información al Cliente de 3M España en el teléfono gratuito: 900 210 584.
Para obtener información adicional fuera de los Estados Unidos, comuníquese con su representante local de 3M o visite nuestro sitio Web, www.3M.com y seleccione su país.

Explicación de los símbolos:

No utilice el producto si el paquete se encuentra dañado o está abierto. | No fabricado con látex de goma natural | Lea cuidadosamente todas las instrucciones de uso. | STERILE R Estéril tratado por irradiación | No reutilice | Fecha de caducidad | LOT Código de lote | Fabricante

3M™ Tegaderm™ + Pad
Filmverband met niet-klevend wondkussen

NL Nederlands

Omschrijving:
Het 3M™ Tegaderm™ +Pad filmverband met niet-klevend wondkussen is een waterbestendig verband dat een barrière vormt tegen bacteriën en virussen*. Het verband bestaat uit een niet-klevend, absorberend kussen, gehecht aan een grotere dunne filmlaag die is voorzien van een hypoallergene, waterbestendige kleeflaag.
*In vitro-tests laten zien dat het transparante filmverband een virale barrière vormt tegen virussen met een diameter van 27 nm of meer, terwijl het verband intact blijft zonder lekken.

Indicaties:
Het 3M™ Tegaderm™ +Pad filmverband met niet-klevend wondkussen is bedoeld voor het verzorgen van acute wonden, zoals snijwonden, oppervlakkige en halfdiepe brandwonden, schaafwonden, insteekplaatsen van infusiekatheters en chirurgische incisies. Het is eveneens bedoeld voor het behandelen van licht exsuderende oppervlakkige en halfdiepe chronische wonden, waaronder decubituswonden, veneuze zweren en diabetische voetzweren. Volg uw 'wondgaas/kleefpleister'-protocol voor het gebruik van dit verband. Dit product is alleen ontwikkeld, wordt alleen verkocht en is alleen bedoeld voor het aangegeven gebruik.

Contra-indicaties:
Niet bekend.

Waarschuwingen:
Het verband is niet bedoeld als vervanging van hechtingen of andere primaire methoden van wondsluiting.

Voorzorgsmaatregelen:
1. Stop eventuele bloeding ter plaatse voordat het verband wordt aangebracht.
2. Breng het verband niet onder spanning aan, aangezien dit huidtrauma kan veroorzaken.
3. Zorg ervoor dat de huid droog is en geen zeepresten en lotion bevat om huidirritatie te voorkomen en een optimale kleefkracht te verzekeren.
4. Het verband mag alleen op een geïnfecteerde plaats worden gebruikt onder strikte controle van een medisch deskundige.

Gebruiksaanwijzing:

Keuze van het verband:
Kies een verband dat groot genoeg is om de kleeflaag op een droge, intacte huid rondom de katheter of een wond aan te brengen.

Voorbereiding van de te behandelen plaats:
1. Bereid de te behandelen plaats voor overeenkomstig het protocol van de zorginstelling.
2. Voor een optimale hechting van het verband kan het nodig zijn overtollig haar weg te halen. Scheren wordt niet aanbevolen.
3. Laat ontsmettingsmiddelen volledig opdrogen alvorens het verband aan te brengen, om zo huidirritaties te voorkomen en een optimale kleefkracht te verzekeren.

Het verband aanbrengen:
1. Open de verpakking en neem de steriele film eruit.
2. Verwijder het schutblad van het verband zodat het kleefoppervlak vrijkomt.
3. Plaats het wondverband met frame over de wond of de insteekplaats en breng het verband aan.
4. Druk het verband aan.
5. Verwijder het papieren kader van het verband terwijl u de randen van het filmverband glad strijkt. Dicht het gesloot rond de insteekplaats of wond goed af. Strijk de kleefrand stevig vast op de huid.

Insteekopening verzorgen:
1. De behandelde plaats moet dagelijks worden gecontroleerd op tekenen van infectie of andere complicaties. Als infectie vermoed wordt, verwijdert u het verband, inspecteert u de insteekopening onmiddellijk en bepaalt u welke medische zorg nodig is. Koorts, pijn, roodheid, zwelling, een ongebruikelijke geur of ongebruikelijke afscheiding kunnen tekenen van infectie zijn.
2. Verving het verband overeenkomstig het protocol van de zorginstelling of wanneer de barrièrevormende eigenschappen zijn aangetast.

Verwijderen:
Pak het verband voorzichtig vast bij een van de randen en haal het langzaam van de huid af in de richting van de haargroei. Voorkom huidletsel door het verband voorzichtig te 'zwiken' in plaats van het opwaarts van de huid weg te trekken.

Opslag en houdbaarheid:
Bewaar dit product op een koele, droge plaats om de beste resultaten te verlengen. Voor de houdbaarheid raadpleegt u de vervaldatum die op elke verpakking staat.

Verpakking en bestelinformatie:
Verkrijgbaar in dozen met afzonderlijk verpakte steriele verbanden. De steriliteit van het verband is gewaarborgd zo lang de individuele verpakking niet is beschadigd of geopend. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met 3M Nederland B.V., Postbus 11072, 2600 BA Delft, Nederland. Tel. 015 - 7 822 372.
Voor informatie buiten de VS, kunt u contact opnemen met uw lokale verhegenwoordiger van 3M of neemt u contact met ons op via www.3M.com en selecteert u uw land.

Verklaring van de symbolen:

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd of open is. | Niet gemaakt met natuurlijk rubber latex | Gelieve bedoelingen voor gebruik te raadplegen | STERILE R Gesteriliseerd door bestraling | Alleen voor eenmalig gebruik | Kleefstrook/drager | LOT Partijcode | Fabrikant

3M™ Tegaderm™ + Pad
Filmförband med icke vidhäftande särdyna

SE Svenska

Beskrivning:
3M™ Tegaderm™ + Pad Filmförband med icke vidhäftande dyna är ett vattentätt förband vilket fungerar som barriär mot bakterier och virus*. Förbandet är belagt med ett vattenavvisande, hypoallergent häftlimne och består av en mot såret icke vidhäftande absorptionsdyna.
*In vitro-tester visar att det transparenta filmförbandet utgör en barriär mot virus som har en storlek på 27 nm i diameter eller större, samtidigt som förbandet förblir intakt och utan läckage.

Indikationer:
3M™ Tegaderm™ + Pad Filmförband med icke vidhäftande dyna är avsett att användas för att täcka akuta sår, som t.ex. skärsår, ytliga och partiella tjockhårdsbrännskador, skrubbsår, IV-katetersättställen och kirurgiska sår. Det är även utformat för att täcka något vätskande ytliga och kroniska partiella tjockhårdssår, inklusive trycksår, venösa sår och diabetiska hålsår. Följ gällande omläggningsrutiner för användning. Denna produkt är inte framställd, såld eller avsedd för någon annan användning än den som angivits.

Kontraindikationer:
Inga kända.

Varningar:
Förbandet är inte avsett att ersätta suturer eller andra primära sårförslutningsmetoder.

Försiktighetsåtgärder:
1. Stoppa eventuell blödning innan förbandet appliceras.
2. Sträck inte förbandet under appliceringen eftersom spänning kan orsaka huskada.
3. Se till att huden är torr och fri från tvålrester och lotion, för att förhindra hudirritation och för att säkerställa god vidhäftning.
4. Förbandet kan användas på ett infekterat område, men då endast under övervakning av sjukvårdspersonal.

Bruksanvisning:

Val av förband:
Välj ett förband som är så stort att en tillräckligt stor kant kan fästa på torr, frisk hud runt såret eller kateterns insticksställe.

Förberedelse av området:
1. Förbered området enligt institutionens protokoll.
2. Hårväxt kan klippas av för att förbättra vidhäftningen. Rakning rekommenderas ej.
3. Vänta tills alla desinfektionsmedel har torkat fullständigt innan förbandet appliceras, för att förhindra hudirritation och säkerställa god vidhäftning.

Applicering:
1. Öppna förpackningen och ta ut det sterila förbandet.
2. Dra av skyddspapperet från förbandet så att den häftande, pappersinramade ytan exponeras.
3. Placera förbandet mitt över insticksstället eller såret och applicera förbandet.
4. Tryck fast förbandet.
5. Lossa pappersramen från förbandet och pressa samtidigt försiktigt ned kanterna på förbandet. Fäst ordentligt runt katetern eller såret. Tryck ner förbandskanterna ordentligt för bästa vidhäftning.

Skötsel av området:
1. Området skall observeras för tecken på infektion eller andra komplikationer. Vid misstanke om infektion: avlägsna förbandet, inspektera det exponerade området och vidta lämpliga medicinska åtgärder. Tecken på infektion kan utgöras av feber, smärta, rodnad, svullnad eller onormal lukt eller sekretion.
2. Byt förbandet enligt institutionens protokoll eller när förbandets barriäregenskaper försämrats

Borttagning:
Fatta försiktigt tag i en kant och "skala" långsamt av förbandet från huden i riktning mot hårs. För att undvika huskada ska förbandet skalas av, inte dras upp från huden.

Förvaring och hållbarhet:
Förvara produkten svalt och torrt för bästa resultat. För uppgift om hållbarhet, se utgångsdatum som finns angivet på varje förpackning.

Förpackning- och beställningsinformation:
Levereras i kartonger med separat förpackade sterila förband. Produktens sterilitet garanteras vid oskadad förpackning. Vid frågor eller synpunkter i USA, var vänlig kontakta 3M Health Care Kundservice, tel 1-800-228-3957.
För ytterligare information utanför USA kan du kontakta din lokala 3M-representant eller besöka oss på 3M.com och välja ditt land.

Förklaring av symboler:

Använd inte om förpackningen är skadad eller öppnad. | Inte tillverkad i naturgummilatex | Varning, läs bruksanvisning. | STERILE R Steriliserad med strålning | För ej återanvändning | Användes före | LOT Partinummer | Tillverkare

3M™ Tegaderm™ + Pad
Filmforbindelse med ikke-klæbende pude

DK Dansk

Beskrivelse:
3M™ Tegaderm™ +Pad filmforbinding med ikke-klæbende pude er designet til behandling af akutte sår, såsom snitsår, overfladiske sår og andengradsforbrændinger, hudafskrabninger, IV-katetersteder og kirurgiske incisioner. Den er også designet til behandling af overfladiske og halvdybe kroniske sår med lav eksudat, herunder liggesår, venøse sår og diabetiske fodsår. Følg hospitalets protokol for anvendelse af "gaze og tape". Produktet er ikke designet, solgt eller beregnet til andre formål end overnævnte.

Kontraindikationer:
Ingen kendte.

Advarsler:
Ikke brug bandagen som erstatning for suturer eller andre primære metoder for lukking af sår.

Forholdsregler:
1. Stands blødninger før bandagen lægges på.
2. For å unngå hudskade. Ikke strekk bandasjen under påføring.
3. Se til at huden er tørr og fri for såpe og krem for å sikre godt feste og unngå irritasjon.
4. Bandasjen kan brukes på et infisert hudområde bare under oppsyn av helsepersonell.

Brukerveiledning:

Bandasjevalg:
Velg en bandasje stor nok til å gi en kant som kan feste seg til tørr og frisk hud rundt kateter- eller sårområde.

Forberedelse av område:
1. Forbered området i samsvar med fastlagte rutiner.
2. Å klippe bort hår på området kan øke bandasjens festeevne. Barbering anbefales ikke.
3. La alle rense- og beskyttelsesmidler tørke grundig før bandasjen legges på for å unngå hudirritasjon og sikre godt feste.

Påføring:
1. Åpne pakken og ta ut den sterile forbinding ut.
2. Fjern beskyttelsespapiret fra bandasjens papirrammen slik at klebestoffet eksponeres.
3. Senter den innrammede åpningen over sår- eller kateterområde og legg bandasjen på.
4. Trykk bandasjen på plass.
5. Fjern papirrammen fra bandasjen mens bandasjens kanter glattes til. Se til at den letter godt rundt kateter- eller sårområde. Stryk den klebende kanten bestemt mot huden.

Pleie av området:
1. Området bør observeres for å se om det er tegn til infeksjon eller andre komplikasjoner. Ved mistanke om infeksjon: Fjern bandasjen, inspiser stedet direkte, og bestem passende medisinsk behandling. Tegn på infeksjon kan være feber, smerter, rødhet, hevelse eller unormal lukt eller utflod.
2. Bytt bandasjen ifølge fastlagte rutiner eller når bandasjens beskyttende egenskaper er svekket.

Fjerning:
Ta varsomt tak i én av kantene og trekk bandasjen langsomt av huden i hårvekstens retning. For å unngå hudskade, dra bandasjen forsiktig bakover i stedet for å trekke den opp fra huden.

Oppbevaring og holdbarhet:
Skal lagres på et kjølig og tørt sted for best resultater. For holdbarhet, se utløpsdato trykt på hver pakke.

Leverings- og bestillingsinformasjon:
Leveres i esker med individuelt pakkede sterile bandasjer. Bandasjens sterilitet garanteres, med mindre enkeltpakken er skadet eller åpnet. Dersom du har spørsmål eller kommentarer innenfor USA, kontakt 3M Health Care kundeservice på 1-800-228-3957.
For mer informasjon utenfor USA, kontakt din nærmeste 3M-representant eller ta kontakt med oss på 3M.com og velg ditt land.

Forklaring av symboler:

Må ikke brukes hvis pakken er skadet eller åpnet. | Fremstilt uten naturgummi-lateks

3M™ Tegaderm™ + Pad

FI

Kalvosidos, jossa tarttumaton haavatyyny

Suomenkielinen

Kuvaus:
3M™ Tegaderm™ + Pad haavakalvo tarttumattomalla haavatyynyllä on vedenkestävä, bakteereilta ja viruksilta* suojaava sidos. Tarttumaton, imunkykyinen haavatyyny on kiinnitelty saumerpaan, ohueen haavakalvoon. Haavakalvon ilmaisine on vedenkestävä ja ihoystävällinen eikä se sisällä lateksia.
*In vitro -testit osoittavat, että läpinäkyvät kalvosidokset suojaavat läpimitaltaan 27 mm:n kokoisilta ja sitä suuremmilta viruksilta, jos sidos on ehjä eikä vuoda.

Käyttökohteet:
3M™ Tegaderm™ + Pad Haavakalvo tarttumattomalla haavatyynyllä on suunniteltu akuuttien vammojen hoitoon, kuten viltohaavaut, palovammat, hiertymät, suonensisäisten kanyylien pistokohtien suojaamisen ja kirurgiset leikkaushaavat. Se on suunniteltu myös vähän tihkuvien pienten pintahaavojen ja puolisyvien kroonisten haavojen hoitoon: makuuhaavat, leikkihaavat ja diabeettiset jalkahaavat. Navattaisiksi käytössä sairaalan omia hoitokäytäntöjä. Tätä tuotetta ei ole suunniteltu muihin kuin edellä määriteltyihin tarkoituksiin.

Vasta-aiheet:
Ei tunnettuja.

Varoitukset:
Sidosta ei ole tarkoitettu korvaamaan ompeleita tai muita ensisijaisia haavansulkumenetelmiä.

Varotoimet:
1. Pistokohdan tai haavan veremuoto on tyrohdytettävä ennen sidoksen laittoa.
2. Älä venytä kalvoa asettaessasi sitä. Venyttäminen saattaa johtaa mekaaniseen ihovaurioon.
3. Varmista, että ihe on kuiva ja ettei siinä ole saippua- tai rasvajäämiä niin, että ihon ärtymisestä välttyään ja hyvä kiinnitys varmistetaan.
4. Sidosta ei saa käyttää infektoituneilla (haavallisilla tai haavattomilla)kuuman vaikeonnessa.

Käyttöohjeet:
Sidoksen valinta:
Valitse tarpeeksi suuri sidos, jotta se kiinnittyy vähintään 2,5 cm:n alueelta kuivasta, terveeseen ihoon haavan tai katetrin pistokohdan ympärillä.

Asettamiskohdan valmistelu:
1. Valmistele asettamiskohta sairaalan hoitokäytännön mukaisesti.
2. Karvoituksen leikkaaminen saattaa parantaa sidoksen kiinnittymistä. Ihokarvojen ajelua ei suositella.
3. Anna kaikkien ihomallisteiden ja suoja-aineiden kuivua kokonaan ennen sidoksen asettamista ihoärsytyksen estämiseksi ja hyvän kiinnityksen varmistamiseksi.

Sidoksen asettaminen:
1. Avaa pakkaus ja ota steriili sidos esiin.
2. Poista sidoksen ilmapintaa suojaava paperi, niin että ilmapinta tulee näkyviin.
3. Aseta kehysteltty ikkuna haavan tai kanyylin pistokohdan päälle.
4. Paina sidos paikalleen.
5. Irrota paperiset kehykset sidoksesta. Taasilla sidoksen reunat painellemalla. Tiiviistä katetrin tai haavan ympärys hyvin. Tasoita ilmarenvust tiivistä kiinni ihoon.

Sidosajanen hoito:
1. Sidosalueita on tarkkailtava päivittäin tulehtuksen tai meiden komplikaatioiden varalta. Jos tulehdusta epäillään, poista sidos ja tarkista pistokohta ja altä ympärivä ihoalue ja pätkä, onko tilalkyä tarpeen. Tulehduksen oireita saattavat olla kuume, kipu, punertava iho, turvotus tai epätavallinen haju tai vuoto.
2. Vaihda sidos sairaalan hoitokäytännön mukaisesti tai jos sidoksen kunto niin vaatii.

Sidoksen poisto:
Tartu sidoksen reunaan varovasti ja vedä sidos hitaasti ihotta kervankarvojun suuntaisesti. Vlata ihovaurioita vetämällä sidosta taskeepäin sen sijaan, että nostaisit sen iholta suoraan ylöspäin.

Varastointi ja säilyvyys:
Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi säilytä viljeissä, kuivassa paikassa. Tuotteen säilyvyys sekvisä pakkauksseen painettuna viimeisestä käyttöpäivästä.

Toimitus- ja tilaustiedot:
Toimitetaan steriilissä, joissa on yksittäispakattuja steriilejä sidoksia. Sidoksen steriiliys on taattu, jos pakkaus on avaamaton ja vaurioitumaton. Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja, ota yhteyttä: Suomen 3M Oy. Terveydenhoitotuotteet, puh. (09) 525 21.
Lisätietoja: Suomen 3M Oy Terveydenhoitotuotteet, puh. (09) 525 21 www.3M.fi.

Symbolien selitykset:

Ei saa kastella, jos pakkaus on vaingoittunut tai auki.		Tuotetta ei ole valmistettu luonnonlateksista.	
Huom! Lue tärkeä käyttöohje!		Sisältää säteilyllä sterilisoidun.	
Viimeinen käyttöpäivä	LOT Eräkoodi		Valmistaja

3M™ Tegaderm™ + Pad

PT

Penso transparente com compressa não aderente

Português

Descrição:
O penso transparente 3M™ Tegaderm™ + Pad com compressa não aderente é um penso de proteção contra vírus, bactérias e resistente à água. O penso é composto por uma compressa absorvente fixa a uma fina película transparente mais larga com um adesivo hipoalergénico sem látex.
*Os testes in vitro demonstram que os pensos de película transparente constituem uma barreira contra vírus com 27 mm de diâmetro, ou mais, enquanto o penso permanece intacto sem fugas.

Indicações:
O penso transparente 3M™ Tegaderm™ + Pad com compressa não absorvente foi concebido para aplicação sobre feridas graves, tais como golpes, queimaduras superficiais e mais profundas, abrasões, lacerações incisão de cateteres IV e incisões cirúrgicas. Também foi concebido para feridas crónicas de exsudação superficial e ou moderada incluindo úlceras de pressão, úlceras venosas e úlceras diabéticas nos pés. Para o uso correcto siga o seu protocolo "compressa e adesivo". O produto não foi concebido, nem pode ser vendido ou utilizado para outros fins que não os indicados.

Contra-indicações:
Nenhuma conhecida.

Avisos:
Não usar o penso como substitutos de suturas e outros métodos primários de encerramento de feridas.

Precauções:
1. Fazer hemostase localizada antes da aplicação do penso.
2. Não esticar o penso durante a aplicação devido à possibilidade de desenvolvimento de traumatismos cutâneos provocados pela tensão.
3. Certifique-se de que a pele está seca e sem restos de sabão e loção, de modo a prevenir irritações da pele e garantir uma boa adesão.
4. O penso só pode ser usado em feridas infetadas mediante vigilância do profissional de saúde.

Instruções de Utilização:
Escolha do penso:
Escolher um penso de dimensões suficientes para permitir a aderência sobre a pele seca e só em torno do caletor ou na zona da lesão.

Preparação do Local:
1. Prepare o local de aplicação de acordo com o protocolo da instituição.
2. A tricotomia da área afetada pode melhorar a adesão. Não é recomendado efetuar a tricotomia com lâmina.
3. Deixar secar completamente todos os produtos de preparação e proteção antes de aplicar o penso para evitar eventual irritação cutânea e assegurar uma boa adesão.

Aplicação:
1. Abrir a embalagem e retirar o penso estéril.
2. Retirar o revestimento de papel do penso expondo a superfície adesiva.
3. Posicionar a moldura do penso sobre a zona da ferida ou do cateter e aplicar o penso.
4. Pressione ligeiramente o penso sobre o local.
5. Remova o revestimento de papel do penso enquanto pressiona as extremidades do mesmo. Sele bem a zona à volta do cateter ou da lesão. Alise firmemente os bordos do adesivo contra a pele.

Cuidados locais:
1. O local deve ser inspecionado diariamente para despiste de eventuais infeções ou outras complicações. Em caso de suspeita de infeção, retirar o penso. Inspecionar diretamente o local e decidir sobre a intervenção médica apropriada. De sinais de infecção podem incluir febre, dor, rubor, edema, odor (anormal) ou pús (exsudato).
2. Mudar o penso de acordo com o protocolo da instituição, ou quando as propriedades de barreira do penso estiverem comprometidas.

Remoção:
Segurar um dos bordos com cuidado e descolar lentamente da pele no sentido do crescimento dos pelos. Evite traumatismos cutâneos puxando o penso para trás (estiramento), e não para cima.

Armazenamento e Prazo de Validade:
Para melhores resultados, armazenar em local fresco e seco. Para obter informação sobre o prazo de validade, veja a data de validade impressa na embalagem.

Informação sobre apresentação e forma de encomendar:
Fornecido em caixas de pensos esterilizados embalados individualmente.
Garante-se a esterilidade do penso a menos que a embalagem individual esteja aberta ou danificada. Para quaisquer dúvidas ou comentários nos EUA, contacte a Linha de Apoio ao Cliente 3M Health Care Customer Helpline através do número 1-800-228-3957.
Para mais informações fora dos Estados Unidos, contacte o seu representante local da 3M ou contacte-nos em 3M.com e selecione o seu país.

Explicação dos Símbolos:

Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta.		Não é fabricado em látex de borracha natural	
Atenção, consulte as instruções de utilização.	ESTÉRIL R	Esterilizado por irradiação	Não reutilizar
Utilizar até à data	LOT Código do lote		Fabricante

3M™ Tegaderm™ + Pad

GR

Επίθεμα Φίλμ με Ταμπόν Χωρίς Κόλλα

Ελληνικά

Περιγραφή:
Το 3M™ Tegaderm™ + Pad Επίθεμα Φίλμ με Ταμπόν Χωρίς Κόλλα, είναι ένα επίθεμα αδιάβροχο και φραγμός μικροβίων και ιών.* Το επίθεμα αποτελείται από ένα απορροφητικό ταμπόν χωρίς κόλλα, ενσωματωμένο σε ένα μεγαλύτερο λεπτό φιλμ επιστρώνοντας με υποαλλεργική κόλλα χωρίς λατέξ.
*In vitro δοκιμές δείχνουν ότι τα διαφανή επιθέματα φίλμ, παρέχουν φραγμό προστασίας έναντι των ιών, διαμέτρου 27 mm και άνω, όταν το επίθεμα παραμένει ακέραιο χωρίς διαρροές.

Ενδείξεις:
Το 3M™ Tegaderm™ + Pad Επίθεμα Φίλμ με Ταμπόν, είναι σχεδιασμένο για χρήση σε αξέα τραύματα όπως κοψίματα, επιφανειακά και μερικού πάχους εγκαύματα, εκδορές, για κάλυψη ενδοφλέβιων καθετήρων και χειρουργικών τομών. Έχει σχεδιαστεί επίσης για να καλύπτει επιφανειακά και μερικού πάχους χρόνια τραύματα με μικρή ποσότητα εκρέτων, συμπεριλαμβανομένων ελκών πίεσης, φλεβικών ελκών και διαβητικά έλκη άκρων. Για την χρήση του, ακολουθείστε την διαδικασία των χρησιμοποιείτε για την «γάζα και ταινία». Αυτό το προϊόν δεν είναι σχεδιασμένο, δεν πωλείται ή δεν προτείνεται για καμία άλλη χρήση εκτός από αυτές για τις οποίες προβλέπεται.

Αντενδείξεις:
Καμία γνωστή.

Προειδοποιήσεις:
Μην χρησιμοποιείτε το επίθεμα για αντικατάσταση ραμμάτων ή άλλων μεθόδων σύγκλεισης τραύματος κατά πρώτο σκοπό.

Προφυλάξεις:
1. Πριν την τοποθέτηση του επιθέματος θα πρέπει να γίνει αιμόσταση του τραύματος.
2. Μη τεντώνετε το επίθεμα κατά την εφαρμογή του, καθώς η τάση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στο δέρμα.
3. Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι στεγνό και δεν παρέχει υπολείμματα σαπουνιού και λοσιόν προς αποφυγή ερεθισμού του δέρματος και για να εξασφαλίσετε η καλή πρόσφυση του επιθέματος.
4. Το επίθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μολυσμένο τραύμα, μόνο υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας.

Οδηγίες χρήσης:
Επιλογή επιθέματος:
Επιλέξτε το μέγεθος του επιθέματος, ώστε να είναι μεγαλύτερο από το τραύμα, έτσι ώστε να καλύπτει σε ομές και στενό δέρμα γύρω από τον καθετήρα ή το τραύμα.

Προετοιμασία της Περιοχής:
1. Προετοιμάστε την περιοχή εφαρμογής του επιθέματος σύμφωνα με το πρωτόκολλο σας.
2. Το κόψιμο των τριχών της περιοχής με clipper, θα βελτιώσει την πρόσφυση του επιθέματος. Το ξύρισμα δεν συνιστάται.
3. Περιμένετε να στεγνώσουν τελείως όλα τα αντισηπτικά γιαρά πριν την τοποθέτηση του επιθέματος, για να αποφευχθούν καλύτερη πρόσφυση και για να αποφύγετε τον ερεθισμό του δέρματος.

Εφαρμογή:
1. Ανοίξτε την συσκευασία και αφαιρέστε το αποστειρωμένο επίθεμα.
2. Ξεκολλήστε το χάρτινο υπόστρωμα από το επίθεμα, αποκαλύπτοντας έτσι την αυτοκολλητη επιφάνεια του.
3. Κρατήστε το επίθεμα από την γάρνιτη περιφέρεια του και τοποθετήστε το πάνω από την περιοχή του τραύματος ή στο σημείο εισόδου του καθετήρα.
4. Πιέστε το επίθεμα για καλύτερη επαφή.
5. Αφαιρέστε το χάρτινο πλαίσιο από το επίθεμα ενώ πιέζετε τις άκρες του προς το δέρμα. Πιέστε και σφραγίστε καλά γύρω από τον καθετήρα ή την τραυματική επιφάνεια. Συνεχίζετε πιέζοντας σταθερά το αυτοκολλητο περίβλημα προς το δέρμα.

Φροντίδα Περιοχής:
1. Η περιοχή πρέπει να ελέγχεται καθημερινά για τυχόν ενδείξεις μόλυνσης ή άλλες επιπλοκές. Εάν υποψιάζεστε μόλυνση, αφαιρέστε το επίθεμα, ελέγξτε το σημείο επαφής και καθορίστε την ανάλογη ιατρική παρέμβαση. Οι ενδείξεις μόλυνσης μπορεί να είναι πυρετός, πόνος, ερυθρότητα, οίδημα, η ασυνήθιστη οσμή,
2. Αλλάξτε το επίθεμα σύμφωνα με το πρωτόκολλο σας, ή όταν οι προστατευτικές του ιδιότητες διακυβευθούνται.

Αφαίρεση:
Κρατήστε προσεκτικά τη μία άκρη και ξεκολλήστε αργά το επίθεμα από το δέρμα προς τη φορά των τριχών. Αποφύγετε τον τραυματισμό του δέρματος ξεκολλώντας το επίθεμα προς τα πίσω, παρά να το τραβάτε από το δέρμα προς τα πάνω.

Αποθήκευση και Διάρκεια Ζωής:
Για καλύτερα αποτελέσματα, αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό μέρος. Για την διάρκεια ζωής, ανατρέξτε στην ημερομηνία λήξης που είναι τυπωμένη σε κάθε συσκευασία.

Τρόπος διάθεσης και πληροφορίες παραγγελίας:
Διατίθεται σε κουτιά, ατομικά συσκευασμένων και αποστειρωμένων επιθεμάτων. Η στειρότητα του επιθέματος είναι εγγυημένη εφόσον η ατομική συσκευασία δεν έχει καταστραφεί ή ανοιχτεί. Για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια επικοινωνήστε από Η.Π.Α. με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών κατόχων προϊόντων της 3M στο τηλέφωνο 1-800-228-3957.
Για περισσότερες πληροφορίες εκτός των Η.Π.Α., επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της 3M ή επισκεφτείτε μαζί μας στο 3M.com και επιλέξτε τη χώρα σας.

Επεξήγηση των Συμβόλων:

Μην τη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά ή έχει ανοιχτεί.		Δεν κατασκευάζεται με φυσικό καουτσούκ λατέξ	
Προσοχή, βλέπε ότι τις οδηγίες χρήσης	ESTÉRIL R	Αποστειρωμένο με ακτινοβολία	Μόνο για μια χρήση
Ημερομηνία λήξης	LOT Κωδικός παρτίδας		Κατασκευαστής

3M™ Tegaderm™ + Pad

PL

Opatrunek z folii z nieprzylepną wkładką

Polski

Opis:
Opatrunek z folii z nieprzylepną wkładką 3M™ Tegaderm™ +Pad jest wodoodporny i stanowi barierę przed bakteriami i wirusami*. Opatrunek składa się z nieprzylepnej chłonnej wkładki połączonej z większym podkładem, wykonanym z cienkiej folii z hipoalergicznym klejem niezawierającym lateksu.
*Testy wirusowe in vitro dowodzą, że przezroczysta folia zapewnia barierę ochronną przed wirusami o średnicy wynoszącej maksymalnie 27 mm, o ile opatrunek pozostaje nienaruszony oraz nie przecieka.

Zastosowanie:
Opatrunek z folii z nieprzylepną wkładką 3M™ Tegaderm™ +Pad służy do opatrywania odrych ran, takich jak nacięcia, oparzenia powierzchniowe i drugiego stopnia, otarcia, wkłucia donaczyniowe oraz cięcia chirurgiczne. Opatrunki te zostały zaprojektowane również z myślą o przewlekłych ranach mało sączących oraz drugiego stopnia, takich jak odleżyny, owrzodzenia żylne oraz cukrzycowe owrzodzenia stóp. W celu użycia należy przestrzegać procedury „gazy i przylepca". Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań, sprzedaży ani użycia niezgodnego z przedstawionymi zaleceniami.

Przeciwwskazania:
Brak znanych.

Ostrzeżenia:
Opatrunku nie należy używać zamiast szwów ani innych metod pierwotnego zamykania rany.

Środki ostrożności:
1. Przed założeniem opatrunku należy zahamować krwawienie.
2. Nie naciągać opatrunku w trakcie zakładania, ponieważ naprężenie może spowodować uraz skóry.
3. Upewnić się, że skóra jest sucha i pozbawiona pozostałości mydła i balsamów, aby zapobiec podrażnieniu skóry i zapewnić dobre przylganie opatrunku.
4. Opatrunek można zakładać na zakażoną okolicę tylko pod nadzorem lekarza.

Instrukcja użycia:
Wybór opatrunku:
Wybrać opatrunek o rozmiarze, który umożliwi przylganie brzegów do suchej i zdrowej skóry dookoła cewnika lub miejsca rany.

Przygotowanie miejsca:
1. Przygotować miejsce zgodnie z protokołem obowiązującym w danej instytucji.
2. Obcięcie włosów w okolicy miejsca wkłucia zwiększa przylganie opatrunku. Golenie nie jest zalecane.
3. Przed założeniem opatrunku poczekać wszystkie preparaty do zupełnego wyschnięcia, aby zapobiec podrażnieniu skóry i zapewnić dobre przylganie się opatrunku.

Nakładanie opatrunku:
1. Otworzyć opakowanie i wyjąć sterylny opatrunek.
2. Odkleić papier zabezpieczający od spodu opatrunku w ramce, odkrywając przylgającą powierzchnię.
3. Umieścić opatrunek z ramką nad rany lub w miejscu wprowadzenia cewnika i przylgnij na skórze w miejscu aplikacji.
4. Dociskać opatrunek do skóry.
5. Zdjąć papierową ramkę z opatrunku, wygładzając jego brzegi. Dokładnie uszczelnić opatrunek dookoła cewnika lub rany. Mocno wygładzić krawędzie z klejem, aby przylgnęły się do skóry.

Pielęgnacja opatrywanego miejsca:
1. Miejsce należy obserwować w celu wykrycia oznak infekcji lub innych powikłań. W przypadku podejrzewania zakażenia odkleić opatrunek, sprawdzić bezpośrednio miejsce wkłucia i zastosować odpowiednią interwencję medyczną. Oznakami zakażenia mogą być: gorączka, ból, zaczerwienienie, swędzenie, nieprzyjemny zapach lub wydzielina.
2. Zmieniać opatrunek zgodnie z procedurami obowiązującymi w placówce lub gdy właściwości barjery ulegną pogorszeniu.

Zdejmowanie opatrunku:
Delikatnie złapać krawędź i powoli odrywać opatrunek od skóry, zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. Zapobiegać urazom skóry, odklejając opatrunek jak najbliżej skóry, a nie pociągając do góry.

Przechowywanie i okres przydatności:
W celu zapewnienia większej skuteczności przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Okres przydatności do użycia: patrz data przydatności umieszczona na każdym opakowaniu.

Sposób dostarczenia i informacje dla zamawiających:
Dostarczane w pudełkach, jako indywidualnie pakowane sterylne opatrunki. Sterylność opatrunku jest gwarantowana pod warunkiem, że pojedyncze opakowanie nie zostanie uszkodzone lub otwarte. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag na terenie Stanów Zjednoczonych należy skontaktować się z linią pomocy dla klientów firmy 3M Health Care pod nr tel. 1-800-228-3957.
Więcej informacji dla klientów spoza Stanów Zjednoczonych można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy 3M. Można też wejść na stronę 3M.com i wybrać swój kraj.

Objaśnienie symbolu:

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.		Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego.	
Uwaga! Przed użyciem należy zapoznać się z dołączoną instrukcją.	ESTÉRIL R	Sterylizowano metodą radiacyjną.	Produkt jednorazowego użytku
Zużyć przed końcem	LOT Kod partii		Producent

Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров 3M™ Tegaderm™ + Pad

RU

Russian

Описание.
Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров 3M™ Tegaderm™ +Pad — водонепроницаемая повязка с защитой от бактерий и вирусов*. Наклейка состоит из неприлипающей водопоглощающей прокладки, приклеенной к тонкой пленке с помощью безаллергенного гипоаллергенного клеящего вещества.
* По результатам тестирования in vitro прозрачная пленочная наклейка служит барьером от вирусов 27 нм в диаметре или более, в то же время оставаясь целой (без утечек).

Показания.
Наклейка прозрачная пленочная для закрытия ран и фиксации катетеров 3M™ Tegaderm™ +Pad предназначена для наложения на сквозные раны, например на порезы, ожоги второй степени, царапины, а также для покрытия областей введения внутривенных катетеров и хирургических разрезов. Ее также можно использовать для наложения на хронические неглубокие малоэкссудативные раны, например на пролежни, венозные язвы и язвы на стопах при диабете. Следуйте протоколу вашего медучреждения по наложению повязок «марля и пластырь». Этот продукт не разработан, не продается и не предназначен для использования в других целях.

Противопоказания.
Не известны.

Предупреждения.
Не используйте наклейку в качестве замены шовного и других материалов для ушивания раны.

Меры предосторожности.
1. Остановите кровотечение на участке наложения, прежде чем накладывать наклейку.
2. Не растягивайте наклейку во время наложения, так как тяжение может повредить кожу.
3. Убедитесь в том, что кожа сухая и на ней нет остатков моющих средств, чтобы избежать раздражения кожи и обеспечить хорошую фиксацию.
4. Наклейка может накладываться на инфицированный участок только под наблюдением медицинского работника.

Инструкция по применению.
Выбор наклейки.
Выберите наклейку такого размера, при котором ширины будет достаточно для прикрепления к участку сухой здоровой кожи вокруг места введения катетера или раны.
Подготовка места наложения.
1. Подготовьте место согласно протоколу учреждения.
2. Удаление волос в месте наложения может улучшить фиксацию. Бритье не рекомендуется.
3. Прежде чем накладывать наклейку, дождитесь полного высыхания антисептических средств во избежание раздражения кожи и для обеспечения хорошей фиксации.

Наложение.
1. Откройте упаковку и достаньте стерильную наклейку.
2. Снимите бумажную подложку с наклейки, освободив клейкую поверхность.
3. Разместите наклейку на рамке над раной или местом введения катетера и кожу и наложите наклейку.
4. Прикладите наклейку.
5. Снимите бумажную рамку с наклейки, разравнивая ее края. Надежно закрепите наклейку вокруг катетера или раны. Хорошо разгладьте края клейкой поверхности на коже.

Уход за местом наложения.
1. Осматривайте место наложения, чтобы убедиться в отсутствии признаков инфекции или других осложнений. При подозрении на инфицирование удалите наклейку, осмотрите непосредственно место наложения и определите необходимые действия по лечению. На инфекцию могут указывать высокая температура, боль, покраснение, припухлость, необычный запах или выделения.
2. Меняйте наклейку в соответствии с протоколом учреждения или если нарушены ее защитные свойства.

Снятие.
Осторожно возьмитесь за край наклейки и медленно снимите ее с кожи по направлению роста волос. Во избежание повреждения кожи отделяйте наклейку, вытягивая ее назад параллельно коже, не тяните ее вверх от кожи.

Условия хранения и срок годности.
Для достижения лучших результатов храните в прохладном, сухом месте, соблюдая сохранность индивидуальной упаковки. Срок годности- 3 года. Дата изготовления или окончания срока годности указана на упаковке.

Утилизация.
Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Форма выпуска и свойства.
Поставка осуществляется в коробках с отдельно запакованными стерильными наклейками. Стерильность наклейки гарантируется при условии, что индивидуальная упаковка не повреждена и не открыта.

Производитель.
"3M Компани", 3M Xenc Кеер", США, 3M Company. 3M Health Care, 3M Center, Bldg. 275, St. Paul, Minnesota 55144-1000, USA

Место производства:
он, не указано

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от покупателей:
ЗАО "3М Россия" 121614, Москва ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел. +7 495 784 7474, факс: +7 495 784 7475

Объяснение символов:

Не используйте продукт, если упаковка повреждена или открыта.		Не содержит натуральный латекс	
Внимание, ознакомьтесь с инструкцией по применению.	ESTÉRIL R	Стерилизовано облучением	Не использовать повторно
Использовать до	LOT Код группы товара		Производитель

3M™ Tegaderm™ + Pad

TR

Yapışmaz Pedli Film Örtüsü

Türkçe

Ürün Tanımı:
Yapışmaz Pedli 3M™ Tegaderm™ +Pad Film Örtüsü su geçirmez, bakteriyel ve viral* bir bariyer örtüdür. Örtü, lateks olmayan, hipoalerjenik yapışkanlı büyük ince bir film desteğe bağlı yapışmaz, emici bir pedden oluşur.
*In vitro testler, örtü suyun yapmaksızın bütünlüğünü koruyken, şeffaf filmin çapı 27 mm veya daha büyük olan virüsler için bir viral bariyer oluşturduğunu göstermektedir.

Endikasyonları:
Yapışmaz Pedli 3M™ Tegaderm™ +Pad Film Örtüsü, kesikler, yüzeyel ve kısmi kalınlıktaki yanıklar, abrazyonlar, IV kateter alanları ve cerrahi insizyonlar gibi akut yaraları kapatmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, bası ülserleri, venöz ülserler ve diyabetik ayak ülserleri gibi düşük eksüdalı yüzeyel ve kısmi kalınlıktaki kronik yaraları kapatmak için de amaçlanmıştır. Kullanım için "gazlı bez ve bant" protokolünüzü izleyin. Bu ürün, burada belirtilen kullanım alanları dışında kullanılmak üzere tasarlanmamış, satışa sunulmamış veya amaçlanmamıştır.

Kontrendikasyonlar:
Bilinen yok.

Uyarılar:
Örtüyü sütürlerin ve diğer birincil yara kapama yöntemlerinin yerine kullanmayın.

Önlemler:
1. Örtüyü uygulamadan önce uygulama alanındaki her türlü kanamayı durdurunuz.
2. Gerginlik denide travmaya yol açabileceğinden uygulama sırasında örtüyü gerdirmeyiniz.
3. Deri tahrişinden korumak ve iyi bir yapışma sağlamak için derinin kuru ve sabun artıklarından ve losyondan arındırılmış olduğundan emin olun.
4. Örtü, sağlıklı olmayan alanlarda, sadece sağlık profesyonelinin gözetimi altında uygulanabilir.

Kullanım talimatları:
Sargı seçimi:
Kateter veya yara bölgesinin etrafındaki kuru, sağlıklı cilde yapışan bir kenar sağlamak üzere yeterli büyüklükte bir örtü boyutu seçin.

Bölgenin hazırlanması:
1. Bölgeyi kurumsal protokole göre hazırlayın.
2. Bölgedeki kılların kesilmesi sargının yapışmasını iyileştirebilir. Tıraş etmek önerilmez.
3. Cilte tahriş önlemek ve iyi yapışmayı sağlamak için, örtüyü uygulamadan önce tüm preparat sıvılarını tamamen kurumasını bekleyin.

Uygulama:
1. Ambalajı açın ve steril sargıyı çıkarın.
2. Yapışkan yüzey açığa çıkacak şekilde kağıt-çerçeveli örtücüleri kağıt astarı soyun.
3. Çerçeveli pencereyi yara bölgesi veya kateter giriş bölgesi üzerine konumlandırın ve örtüyü uygulayın.
4. Örtüyü yerine bastırın.
5. Örtünün kenarlarını düzeltirken kağıt çerçeveyi örtüden çıkarın. Kateter veya yara bölgesinin etrafını sıkıca kapatın. Yapışkan kenarı cilde doğru düz bir şekilde düzeltin.

Giriş Bölgesinin Bakımı:
1. Bölge, enfeksiyon veya diğer komplikasyonlara karşı gözlemlenmelidir. Enfeksiyon şüphesi olursa sargıyı çıkarın, bölgeyi doğrudan inceleyin ve uygun tıbbi müdahaleye karar verin. Ateş, ağrı, kızarıklık, şişme veya alışılmadık koku veya akıntı enfeksiyona işaret edebilir.
2. Örtüyü kurum protokolüne göre veya bariyer özellikleri risk taşıdığında değiştirin.

Çıkarma:
Bir kenarı hafifçe tutun ve örtüyü saçın uzaması yönünde cildten yavaşça soyun. Örtüyü cilten yukarı doğru çekmek yerine, geriye doğru sıyırarak cilt üzerindeki stresi önüne geçin.

Saklama ve Raf Ömrü:
En iyi sonuçlar için, serin, kuru bir yerde saklayın. Raf ömrü için her paketin üzerine basılan son kullanma tarihine bakın.

Tedarik Şekli ve Sipariş Bilgileri:
Ayrı ayrı paketlenmiş steril örtülerin bulunduğu kutular içinde tedarik edilir. Örtünün sterilliği, kendi ambalajı hasar görmediği veya açılmadığı sürece garanti edilir. Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa, ABD'de 1-800-228-3957 numaralı telefondan 3M Health Care Müşteri Yardım Hattı'nı arayın.
ABD dışında daha fazla bilgi için, yerel 3M temsilcinizle veya 3M.com sitesinden bizimle iletişime geçin ve ülkenizi seçin.

Sembollerin Açıklaması:

Ambalaj hasarlı veya açık ise kullanmayın.		Doğal Kauçuk Lateksten Yapılmamıştır	
Bilgi için kullanıcıların kullanmasını	ESTÉRIL R	Sterilize radyasyon yöntemi ile steril edilmiştir.	Tekrar kullanmayın.
Son kullanma tarihi	LOT Parti kodu		Üretici

3M™ Tegaderm™ + Pad

BG

Филмираща превръзка с неприлепваща подложка

Български

Описание:
Филмираща превръзка с неприлепваща подложка 3M™ Tegaderm™ +Pad е водоустойчива превръзка, действаща като бактериална и вирусна* бариера. Превръзката се състои от неприлепваща, абсорбираща подложка, прикрепена към по-голям по размер тънък филм посредством неалергенно, хипоалергенно лепило.
*In vitro тестовете показват, че прозрачният филм осигурява бариера срещу вируси с диаметър 27 mm или по-големи, като превръзката остава интактна и непропусква.

Показания:
Филмираща превръзка с неприлепваща подложка 3M™ Tegaderm™ +Pad е предназначена за покриване на остри рани като порязвания, повърхностни изгаряния и изгаряния с частична дебелина, охлузвания, места на въвеждане на интравенозни катетри и хирургическа разрези. Тя е предназначена също за покриване на слабо ексудиращи повърхностни рани и хронични рани с частична дебелина, включително декубитални язви, венозни язви и диабетични язви по краката. Следвайте протокола „марля и лепенка" за употреба. Този продукт е разработен, продаван се и е предназначен за употреба само в описаните за това случаи.

Противопоказания:
Не са известни.

Предупреждения:
Не използвайте превръзката като заместител на хирургически шевове и други методи за първично затваряне на рани.

Предпазни мерки:
1. Преди поставяне на превръзката трябва да бъде спряно всякакво кървене от рането.
2. Не разтягайте превръзката по време на поставянето, тъй като разтягането може да причини травмиране на кожата.
3. Уверете се, че кожата е суха и без остатъци от сапун и мазила, за да предотвратите кожно раздразнение и да гарантирате добро прилепване.
4. Превръзката може да се използва на инфектирано място само под наблюдение от страна на лекар.

Инструкции за употреба:
Избор на превръзка:
Изберете достатъчно голям размер превръзка, така че да се осигури поле, което да прилепне към сухата здрава кожа около катетъра или рането.

Подготовка на мястото:
1. Подгответе мястото в съответствие с протокола на лечебното заведение.
2. Подстригването на окосмяването на мястото може да подобри прилепването на превръзката. Не се препоръчва бръснене.
3. За да гарантирате дразнене на кожата и да осигурите добро прилепване, оставете всички вещества за подготовка и защита на кожата да изсъхнат напълно, преди да поставите превръзката.

Поставяне:
1. Отворете опаковката и извадете стерилната превръзка.
2. Отстранете предпазния картонен слой от превръзката с оформено прозорче, за да разкриете залепващата повърхност.
3. Позиционирайте прозрачното с рамка над мястото на рането или над мястото на въвеждане на катетъра и поставете превръзката.
4. Притиснете превръзката на място.
5. Отстранете картонената рамка от превръзката, докато заглаждате надолу ръбовете на превръзката. Залепете добре около мястото на катетъра или рането. Притиснете добре залепващия ръб към кожата.

Грижи за мястото на превръзката:
1. Мястото на поставяне трябва да се наблюдава всекидневно за признаци на инфекция или други усложнения. Ако имате подозрения за инфекция, отстранете превръзката, прегледайте мястото директно и определете необходимата медицинска интервенция. Инфекцията може да се прояви като повишена температура, болка, зачервяване, подуване, необичаен мирис или отделяне на секрет.
2. Сменяйте превръзката съгласно протокола на вашето здравно заведение или когато бариерните свойства са били компрометирани.

Отстраняване:
Внимателно хванете ръба и бавно отлепете превръзката от кожата по посока на растежа на косъма. За да избегнете травма на кожата, издърпвайте превръзката в посока назад, а не я дърпайте нагоре от кожата.

Съхранение и срок на годност:
За да гарантирате най-добра резултати, съхранявайте на хладно и сухо място. Срокът на срока на годност вижте датата на годност, отбелязана върху всяка опаковка.

Как се доставя и информация за поръчка:
Доставя се в кутии с отделно опаковани стерилни превръзки. Стерилността на превръзката е гарантирана, ако индивидуалната опаковка не е повредена или отворена. Ако имате някакви въпроси или коментари, за САЩ се свържете с линията за помощ на клиенти на 3M Health Care на телефон 1-800-228-3957.
За допълнителна информация извън САЩ се свържете с местния представител на 3M или с нас на адрес 3M.com, като изберете своята държава.

Обяснение на символите:

Не използвайте продукта, ако опаковката е отворена или повредена.		Не е изработен с естествен каучуков латекс	
Внимание! Направете справка с инструкцията за употреба.	ESTÉRIL R	Стерилизиран с радиация	Да не се употребява повторно
Да се използва преди датата	LOT Код на група стоки		Производител

3M™ Tegaderm™ + Pad

KZ

Жабыспайтын таңғышы бар жастықша

қазақ

Сипаттамасы.
3M™ Tegaderm™