

Mepilex® Border med Safetac® teknologi

Selvklaebende skumbandage af blød silikone



Produktbeskrivelse

Mepilex Border består af:

1. et sårkontaktslag af blød silikone (Safetac®) på en polyuretanfilm
2. en fleksibel, absorberende pude i tre lag; polyuretansum, et nonwoven spredningslag af viskose/polyester og et lag med superabsorbente polykrylatfibre
3. en ydre polyuretanfilm, der er åndbar og vandtæt

Safetac er en unik og patienteret klædeftekologi, der minimerer smerte hos patienter og traume mod såret og den omkringliggende hud.

Mepilex Border er en meget formbar, sekækæbende bandage, der absorberer væske, behøver et fugtigt såhældingsmiljø samt minimerer risikoen for maceration. Da Mepilex Border bevarer et fugtigt såhældingsmiljø, som undstørter debridering, kan der forekomme en øget sårstørrelses initiat. Det er normalt og kan forevantes.

Anvendelsesområde

Mepilex Border er udviklet til en bred vifte af væskende sår, såsom tryksår, ben- og fodsår og traumatiske sår, f.eks. ritter og operationssår.

Mepilex Border kan også anvendes på torre/nekrotiske sår sammen med gelér. Med til at forhindre hudsader, f.eks. tryksår, postoperativ blæredamnetse.

Brugsanvisning

1. Rens såret efter normale procedurer.
2. Tør den omkringliggende hud grundigt.
3. Fjern beskyttelsespapret, og applicer bandagen med den kæbende side mod såret. Stæk ikke bandagen.
4. For opnåelse af den bedste resultatl skal Mepilex Border overlæppe den torre omkringliggende hud med mindst 1-2 cm for de mindste størrelser (størrelser op til 12,5 x 12,5 cm) og 5 cm for de største størrelser med det formål at beskytte den omkringliggende hud mod maceration og at sikre bandagen sikert.



Mepilex Border kan blive sidstende i flere dage afhængigt af sårrets og den omkringliggende huds tilstand, efter hvad den kliniske retningslinjer anbefaler.

I begyndelsen kan det være nødvendigt at skifte bandagen hyppigere, fordi en ændring i behandlingen kan resultere i en forøgelse af væske i starten.

Mepilex Border kan anvendes under kompressionsbandager.

Forholdsregler

Bandagen må ikke anvendes på patienter med kendt overfølsomhed over for bandagen eller dens komponenter. I tilfælde af tegn på klinisk infektion bør du konsultere en læge og få en passende infektionsbehandling.

Anvend ikke Mepilex Border sammen med oxiderede midler som f.eks., hypochloritopløsninger eller hydrogenperoxid.

Brugen af bandager som led i en profilaktisk behandling udeuden ikke behovet for fortsætte med at udvike og følge en omfattende forebyggelsesprotokol for troksår ds. statteoverlader, positionering, ernæring, hydrering, hudpleje og mobilitet.

Opbevaring og bortsaffelse

Mepilex Border bør opbevares tørt ved temperaturer under 35 °C.

Bortsaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljømæssige procedurer.

Andre oplysninger

Det polyuretanskum, der anvendes i produktet, kan skifte farve til en mere gultig farve, når det udsættes for lys, luft og/eller varme. Farveændringen har ingen indflydelse på produkts egenskaber, når det blot anvendes for udlebsdatoen.

Må ikke genbruges. Hvis produktet genanvendes, kan det begynde at fungere dårligere, og der kan forekomme krydskontamination.

Steril. Må ikke anvendes, hvis den indvendige emballage er beskadiget eller har været åbnet før anvendelsen. Må ikke restilleres.

Hvis produktet anvendes efter udlebsdatoen, kan der ikke garanteres for produktbegagnerne.

Mepilex og Safetac er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB