Suprasorb® X + PHMB

Antimikrobielle Hydrofaserwundverband - Tamponaden
Pansement à mèche Hydrofibre antimicrobien
Antimicrobial HydroBalance wound dressing / packing rope
Apósito / taponamiento antimicrobiano HydroBalance
Penso / tamponamento antimicrobiano HydroBalance
Medicazione antimicrobica HydroBalance in compresse / tamponi
Antimicrobiaal HydroBalance-wondverband + wondtampon
Antimikrobiell Hydrofaser-sårbandage / -tamponade
Antimikrobielt HydroBalance-sårforbind / -tamponade
Antimikrobiell HydroBalance-hävsnäcke/-tamponi
Antimikrobiellt Hydrofiberförband cirkar na rana / tamponade
Antimikrobiálny obväz na rany / tamponáda HydroBalance
Antimikrobiálny HydroBalance vlákson / tampon
Antibakteriyel Hydro Balance ovatınmek / tamponada
Protivirusna HydroBalance oblaga za rane / tamponada
Antimikrobni HydroBalance-povoj za rane / - tamponada
Τσημχεσιοβιακός επίθεσης τουαλμπτος / επτικωλτσιμός HydroBalance
Antimikrobiyal HydroBalance yara örtüsü / yara oldukuru

Bacteria
Bacillus subtilis
Enterobacter cloacae
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas putida
Salmonella choleraesuis
Salmonella typhimurium
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus (MRSA)
Enterococcus faecalis (VRE)
Streptococcus faecalis
Streptococcus pneumoniae
Proteus mirabilis
Serratia marcescens
Staphylococcus epidermis
Streptococcus pyogenes

Fungi
Aspergillus niger
Trichophyton mentagrophytes
Yeasts
Candida albicans
Rhodotorula rubra
Saccharomyces cerevisiae

Anaerobe Organism
Bacteroides fragilis
Clostridium perfringens
Peptostreptococcus prevotii

STERILE R
Do not use if package is damaged.
Keep dry.
Recyclable packaging
Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Rheda-Wiedenbrück • 33378 Rangsdorf, Germany
www.Lohmann-Rauscher.com
4041261-1106-EN

de Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung:
Die Suprasorb® X + PHMB Antimikrobiellen HydroBalance-Wundverbänder-Tamponaden wirken antimikrobiell gegen ein breites Erregerspektrum*. In vitro konnte eine sehr schnelle und tiefe vollständige Freisetzung von Polihexanid (PHMB) aus der Wundauflage nach 24 h gezeigt werden. Zusätzlich können die Produkte je nach Wundzustand Feuchtigkeit an die Wunde abgeben oder überschüssiges Exsudat aufnehmen. Damit wird ein feuchtes Wundmilieu geschaffen. Der Verbandwechsel erfolgt atraumatisch. Das Material erlaubt eine einfache Anpassung an die jeweilige Wundform und Wundtiefe. Die Produkte sind deshalb auch für schwer zu versorgende Körperstellen besonders geeignet. Die positiven Eigenschaften der Wundauflage wirken einem Verkleben mit der Wunde oder dem Sekundärverband entgegen. Das feuchte Milieu mit dem kühlenden Effekt wird von den Patienten als angenehm und schmerzlindernd empfunden.

Die Produkte sind einzeln steril verpackt und strahlensterilisiert.

Die Suprasorb® X + PHMB Antimikrobiellen HydroBalance-Wundverbänder-Tamponaden sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht resterilisiert werden.

* Erregerspektrum in vitro nachgewiesen siehe 1. Spalte der Gebrauchsanweisung

Produktzusammensetzung:
Die Suprasorb® X + PHMB Antimikrobiellen HydroBalance-Wundverbänder-Tamponaden bestehen aus Cellulose, Wasser und 0,3 % Polyhexamethylenbiguanid (PHMB/Polihexanid).

Zweckbestimmung:
Suprasorb® X + PHMB Antimikrobielle HydroBalance-Wundverbänder-Tamponaden dienen der Wundheilung oder der Wundflächenreduktion von infektgefährdeten oder infizierten Wunden.

Indikationen:
Die Suprasorb® X + PHMB Antimikrobiellen HydroBalance-Wundverbänder-Tamponaden können bei infektgefährdeten oder infizierten Wunden angewendet werden, wenn sie

- schwach bis mittel exsudierend,
- oberflächlich oder
- tief sind, bei
  - arterieller und venöser Ulcera
  - diabetische Ulcera
  - Druckgeschwüre
  - oberflächliche Verbrennungen 2. Grades
  - postoperativen chirurgischen Wunden
  - Hauttransplantate
  - Spalthauttransplantaten
  - Schürfwunden, Lazerationen

Kontraindikationen:
- Verbrennungen 3. Grades
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen PHMB (Polihexanid) nicht anwenden
- Wunden mit freiliegendem Knorpelgewebe (hyaliner Knorpel)

Nebenwirkungen:
In sehr seltenen Fällen können Hautunverträglichkeiten oder Allergien auftreten. Es sind Fälle von Schock mit einem anaphylaktischen Schock oder Schmerzen zu Beginn der Behandlung beschrieben.

Anwendungshinweise:
1. Vorbereiten der Wunde:
Die Wunde sorgfältig reinigen. Die umgebende Haut sollte sauber und trocken sein.

2. Anlegen des Wundverbandes:
a) Besonderer Sicherheitshinweise aufgrund von dem enthaltenen PHMB beim Anlegen des Wundverbandes sind nicht notwendig. Die Größe des Verbandes richtet sich nach der Wundfläche. Der Verband sollte die Wunde um 2-3 cm überlappen.
b) Die Sterilverpackung öffnen und den Verband unter aseptischen Bedingungen herausnehmen. Den Schutzfilm auf beiden Seiten entfernen. Den Verband kann mit beiden Seiten auf die Wunde aufgelegt werden.
b) Bei Bedarf können der Wundverband und die Tamponade mit einer steilen Schere zugeschnitten werden.
Den Wundverband auf die Wunde auflegen, anmodellieren und mit einer geeigneten Sekundärabdeckung (Suprasorb® P Rollenverband, Suprasorb® P Schaumverband) fixieren.
b) Bei Verwendung der Tamponade diese mehrmals falten und locker in die Wunde einbringen. Die Wunde nicht ganz auffüllen. Die Tamponade mit einem geeigneten Sekundärverband (Suprasorb® P Rollenverband, Suprasorb® P Schaumverband) abdecken.

3. Verbandwechsel:
Die Zeitabstände, in denen die Suprasorb® X + PHMB Antimikrobiellen HydroBalance-Wundverbänder-Tamponaden erneuert werden müssen, setzt der behandelnde Arzt je nach Wundzustand fest (bisherige klinische Erfahrungen liegen im Bereich von bis zu 7 Tagen).
a) Den Sekundärverband entfernen.
b1) Den Suprasorb® X + PHMB Antimikrobiellen HydroBalance-Wundverband an einer Seite vorsichtig anheben und anschließend den Wundverband behutsam von der Wunde abziehen.
b2) Die Suprasorb® X + PHMB Antimikrobielle HydroBalance-Tamponade behutsam aus der Wunde herausziehen.
c) Den entfernten Wundverband oder die Tamponade entsorgen (nicht wiederverwenden).
d) Vor dem Anbringen eines weiteren Wundverbandes oder einer Tamponade die Wunde reinigen.

Vorsichtsmaßnahmen:
Wenden Sie sich bitte bei Auftreten der folgenden Symptome an einen Arzt oder eine Pflegekraft:
- Veränderung von Färbung und/oder Geruch der Wunde
- stagnierende Wundheilung
- klinische Anzeichen einer Infektion

Bei bekannter Unverträglichkeit oder einer Allergie gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe darf das Produkt nicht angewendet werden. Bei der Behandlung mit einem Wunden ist der Wundverband nicht als alleinige Therapiemaßnahme einzusetzen, sondern ist nach Erreichen der Behandlungsziele Arzte durch eine medikamentöse Therapie in Übereinstimmung mit lokalen ärztlichen Protokollen zu ergänzen.

Möglichen Wechselwirkungen zwischen kationischen PHMB und antionischer Hyaluronsäure sowie anderen anionischen Produkten sind zu beachten, da durch die Bindung der Ionen die antimikrobielle Wirkung des PHMBs reduziert werden kann.

Bei kontinuierlicher Anwendung kann Suprasorb® X + PHMB in Einzelfällen für mehr als 30 Tage angewendet werden. Über die Anwendung in der Schwangerschaft, bei stillenden Frauen sowie bei Kindern im Alter von bis zu zwei Jahren entscheidet der behandelnde Arzt. Dies wird aber nicht empfohlen, da hierzu zur Zeit keine dokumentierten klinischen Erfahrungen mit dem Produkt vorliegen.

Sollte der Verband antrocknen, muss eine ausreichende Rehydrierung mit einer Einwirkzeit von mindestens 10 Minuten vor dem Entfernen erfolgen.

fr Mode d'emploi

Description du produit :
Les pansements/mèches HydroBalance antimicrobiens Suprasorb® X + PHMB exercent une action antimicrobienne contre un large spectre d'agents pathogènes*. La libération très rapide et quasi-totale du polyhexanide (PHMB) issu du pansement a pu être démontrée in vitro après 24h. En outre, selon l'état de la plaie, les produits peuvent hydrater celle-ci ou absorber l'exsudat excédentaire. Cela permet de créer un milieu humide au niveau de la plaie. Le changement de pansement est atraumatique. Le matériau permet une adaptation simple à la forme et à l'étendue de la plaie. Les produits conviennent donc particulièrement même aux zones corporelles difficiles à soigner. Les propriétés positives du pansement préviennent toute adhérence à la plaie ou au pansement secondaire. Le milieu humide avec son effet rafraîchissant est ressenti comme agréable et apaisant par le patient.

Les produits sont conditionnés sous emballage individuel stérile et stérilisés par irradiation.

Les pansements/mèches HydroBalance antimicrobiens Suprasorb® X + PHMB sont conçus uniquement pour un usage unique et ne peuvent être restérilisés.

* Spectre d'agents pathogènes démontré in vitro, voir 1e colonne du mode d'emploi

Composition du produit :
Les pansements/mèches HydroBalance antimicrobiens Suprasorb® X + PHMB sont composés de cellulose, d'eau et de 0,3 % de polyhexaméthylène biguanide (PHMB/polyhexanide).

Finalité :
Les pansements/mèches HydroBalance antimicrobiens Suprasorb® X + PHMB servent à la cicatrisation ou la réduction de la surface des plaies infectées ou présentant un risque d'infection.

Indications :
Les pansements/mèches HydroBalance antimicrobiens Suprasorb® X + PHMB peuvent être utilisés en cas de plaies infectées ou présentant un risque d'infection, lorsqu'elles sont

- faiblement à modérément exsudatives,
- superficielles ou
- profondes, en cas
  - d'ulcères artériels ou veineux
  - d'ulcères diabétiques
  - d'escarres
  - de brûlures superficielles au 2e degré
  - de plaies chirurgicales postopératoires
  - de greffes cutanées
  - de sites donneurs de greffe
  - d'écorchures, de lacérations

Contre-indications :
- brûlures au 3e degré
- ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue au PHMB (polyhexanide)
- lésions comportant des tissus cartilagineux à nu (cartilage hyalin)

Effets indésirables :
Dans de rares cas, des intolérances cutanées ou des allergies peuvent apparaître. Des cas isolés de choc anaphylactique ou de douleurs en début de traitement ont été rapportés.

Conseils d'utilisation :
1. Préparation de la plaie :
Nettoyer soigneusement la plaie. La peau périssonnelle devrait être propre et saine.

2. Pose du pansement :
a) Des consignes de sécurité spécifiques ne sont pas nécessaires lors de la pose du pansement en raison de la présence de PHMB. La taille du pansement est choisie en fonction de la surface de la plaie. Le pansement devrait déborder de 2 à 3 cm de la plaie.
b) Ouvrir l'emballage stérile et extraire le pansement dans des conditions aseptiques. Enlever le film de protection des deux côtés. Chacun des deux côtés du pansement peut être appliqué sur la plaie.
c) Le pansement et la mèche peuvent être découpés à l'aide de ciseaux propres. Appliquer le pansement sur la plaie, le mettre en forme, puis le fixer à l'aide d'un recouvrement secondaire approprié (Suprasorb® P pansement film, Suprasorb® P pansement de mousse).
d) En cas d'utilisation de la mèche, la plier plusieurs fois et l'insérer dans la plaie sans tasser. Ne pas remplir intégralement la plaie. Recouvrir la mèche d'un pansement secondaire adéquat (Suprasorb® P pansement film, Suprasorb® P pansement de mousse).

3. Changement de pansement :
Les intervalles de temps séparant deux changements de pansements/mèches HydroBalance antimicrobiens Suprasorb® X + PHMB sont définis par le médecin traitant en fonction de l'état de la plaie (expériences cliniques faites jusqu'ici allant jusqu'à 7 jours).
a) Enlever le pansement secondaire.
b1) Soulever délicatement un côté du pansement HydroBalance antimicrobien Suprasorb® X + PHMB, puis le retirer doucement de la plaie.
b2) Retirer délicatement la mèche HydroBalance antimicrobienne Suprasorb® X + PHMB de la plaie.
c) Éliminer le pansement ou la mèche retirés (ne pas les réutiliser).
d) Nettoyer la plaie avant de poser un nouveau pansement ou une nouvelle mèche.

Précautions :
En cas d'apparition des symptômes suivants, veuillez vous adresser à un médecin ou au personnel soignant :
- modification de couleur et/ou d'odeur de la plaie
- stagnation de la cicatrisation
- signes cliniques d'une infection

En cas d'intolérance connue ou d'allergie à l'un ou à plusieurs composants, le produit ne doit pas être utilisé.
En cas de traitement de plaies infectées, le pansement ne doit pas être utilisé comme seul moyen thérapeutique, mais il doit être complété selon l'appréciation du médecin traitant par un traitement médicamenteux conforme aux protocoles cliniques locaux.
Il convient de prendre en compte les interactions possibles entre le PHMB cationique et l'acide hyaluronique ainsi que d'autres produits anioniques car l'effet antimicrobien du PHMB peut être réduit en raison de la liaison des ions.

En cas d'utilisation continue, Suprasorb® X+PHMB peut être appliqué dans des cas isolés pendant plus de 30 jours. Le médecin traitant décide de l'utilisation durant la grossesse, pendant l'allaitement et chez les enfants âgés de jusqu'à deux ans. Ceci n'est toutefois pas recommandé car on a manière, n'existe actuellement aucune expérience clinique documentée avec le produit.

Si le pansement vient à sécher, il convient de procéder à une réhydratation suffisante en respectant un délai d'action de 10 minutes minimum avant l'enlèvement.

en Instructions for Use

Product Description:
Suprasorb® X + PHMB Antimicrobial HydroBalance wound dressing / packing rope exert an antimicrobial action against a wide spectrum of pathogens*. In vitro, very rapid and almost complete release of polyhexanide (PHMB) from the dressing after 24 h has been demonstrated. Additionally, depending on the condition of the wound, the products can either donate moisture to the wound or absorb excess exudate. This creates a moist wound environment. Changing the dressing is traumatic. The material enables it easy to conform to the wound's particular shape and depth. The products are therefore particularly suitable for areas of the body which are difficult to dress. The positive properties of the dressing counter possible adhesion to the wound or to the secondary dressing. The moist environment with a cooling effect is perceived by patients as pleasant and soothing.

The products are sterile packed individually and sterilised by irradiation.

Suprasorb® X + PHMB Antimicrobial HydroBalance wound dressing / packing rope are for single use only and must not be resterilised.

* Pathogen spectrum detected in vitro, see first column of Instructions for Use

Product Composition:
Suprasorb® X + PHMB Antimicrobial HydroBalance wound dressing / packing rope consists of cellulose, water and 0.3% polyhexamethylene biguanide (PHMB/polyhexanide).

Intended Use:
Suprasorb® X + PHMB Antimicrobial HydroBalance wound dressing / packing rope and wound healing or reduction of the wound area of wounds at risk of infection or infected wounds.

Indications:
Suprasorb® X + PHMB Antimicrobial HydroBalance wound dressings / packing rope can be used for wounds at risk of infection or infected wounds which

- have slight to moderate levels of exudate,
- are superficial or
- deep, for
  - arterial and venous ulcers
  - diabetic ulcers
  - pressure ulcers
  - superficial 2nd degree burns
  - postoperative surgical wounds
  - skin grafts
  - skin graft donor sites
  - abrasions, lacerations

Contraindications:
- 3rd degree burns
- do not use on individuals with a known sensitivity to PHMB (polyhexanide)
- wounds with exposed cartilage tissue (hyaline cartilage)

Side effects:
In very rare cases skin irritation or allergies may occur. Isolated cases of anaphylactic shock or pain at the beginning of treatment have been described.

Instructions for Use:
1. Wound Preparation:
Cleanse wound thoroughly. The surrounding skin should be clean and dry.

2. Application of the Wound Dressing:
a) Special safety instructions for application of the wound dressing due to the PHMB it contains are not necessary. The size of the dressing depends on the wound size. The dressing should overlap the wound by 2-3 cm.
b) Open the sterile pouch and remove the dressing under aseptic conditions. Remove the protective film from both sides. Either side of the dressing may be applied to the wound.
c) If required, the wound dressing and the packing rope may be cut to size with sterile scissors.
Place the wound dressing on the wound, smooth it down and secure it with a suitable secondary covering (Suprasorb® P film dressing, Suprasorb® P foam dressing).
d) When using the packing rope, fold it several times and insert it loosely into the wound. Do not completely fill the wound. Cover the packing rope with a suitable secondary dressing (Suprasorb® P film dressing, Suprasorb® P foam dressing).

3. Dressing change:
The intervals at which the Suprasorb® X + PHMB Antimicrobial HydroBalance wound dressings / packing rope must be replaced are determined by the treating doctor depending on the condition of the wound (up to 7 days according to previous clinical experience).
a) Remove the secondary dressing.
b1) Carefully lift one edge of the Suprasorb® X + PHMB Antimicrobial HydroBalance wound dressing, then gently peel the dressing from the wound.
b2) Gently pull out the Suprasorb® X + PHMB Antimicrobial HydroBalance packing rope from the wound.
c) Dispose of the removed wound dressing or rope (do not reuse).
d) Cleanse the wound before applying a new wound dressing or rope.

Precautions:
Please contact a doctor or nurse if any of the following symptoms should occur:
- change in colour and/or odour of the wound
- stagnant wound healing
- clinical signs of infection

The product may not be used in the presence of a known intolerance or allergy to one or several of its constituents. The wound dressing should not be used as the sole therapeutic measure but must be complemented by drug therapy at the discretion of the treating doctor in accordance with local clinical protocols.
Note that there might be interactions between cationic PHMB and anionic hyaluronic acid, as well as other anionic products, as the antimicrobial action of the PHMBs may be reduced by the binding of the ions.

In the case continuous use, Suprasorb® X + PHMB can be used for more than 30 days in exceptional cases.
The treating doctor makes the decision about use during pregnancy, on breastfeeding women and children aged up to two years. However, this is not recommended, as there is currently no documented clinical experience with the product in relation to this.

Should the dressing dry out, there must be adequate rehydration, with an application time of at least 10 minutes before removal.

es Instrucciones de uso

Descripción del producto:
Los apósitos/taponamientos antimicrobianos HydroBalance Suprasorb® X + PHMB tienen efecto antimicrobiano sobre un amplio espectro de microorganismos patogénicos*. In vitro fue posible demostrar una liberación muy rápida y prácticamente total de polihexanida (PHMB) desde el apósito después de 24 horas. Además, según el estado de la herida, los productos pueden proporcionar humedad a la misma o absorber el exceso de exudado. De este modo, se crea un ambiente húmedo para la herida. El cambio de apósitos es atraumático. El material posibilita una adaptación sencilla a la forma y profundidad de cada herida. Por consiguiente, los productos son especialmente aptos para las partes del cuerpo de difícil acceso. Las propiedades positivas del apósito impiden la adherencia a la herida o al apósito secundario. El medio húmedo, por su efecto refrescante, proporciona al paciente una sensación agradable y de alivio del dolor.

Los productos están envasados individualmente en condiciones estériles y son esterilizados por radiación.

Los apósitos/taponamientos antimicrobianos HydroBalance Suprasorb® X + PHMB están destinados a un solo uso y no deben resterilizarse.

* Véase la determinación in vitro del espectro de agentes infecciosos en la primera columna de las instrucciones de uso

Composición del producto:
Los apósitos/taponamientos antimicrobianos HydroBalance Suprasorb® X + PHMB están compuestos por celulosa, agua y 0,3 % de polihexametilenbiguanida (PHMB/polihexanida).

Finalidad prevista:
Los apósitos/taponamientos antimicrobianos HydroBalance Suprasorb® X + PHMB promueven la cicatrización o la reducción de la superficie de las heridas con riesgo de infección o infectadas.

Indicaciones:
Los apósitos/taponamientos antimicrobianos HydroBalance Suprasorb® X + PHMB pueden utilizarse en heridas con riesgo de infección o infectadas si son

- de exudación escasa a media,
- superficiales o
- profundas, en
  - úlceras arteriales y venosas
  - úlceras diabéticas
  - úlceras por presión
  - quemaduras superficiales de segundo grado
  - heridas quirúrgicas postoperatorias
  - traslantes de piel
  - sitios de separación dermoepidérmica
  - excoriaciones, laceraciones

Contraindicaciones:
- quemaduras de tercer grado
- no utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a la PHMB (polihexanida)
- heridas con tejido cartilaginoso expuesto (cartílago hialino)

Efectos secundarios:
Muy raras veces pueden producirse intolerancia cutánea o alergias. Se han descrito casos aislados de choque anafiláctico o de dolor al comienzo del tratamiento.

Modo de aplicación:
1. Preparación de la herida:
Limpiar la herida cuidadosamente. La piel circundante debería estar limpia y seca.

2. Aplicación del apósito:
a) Durante la aplicación del apósito no son necesarias precauciones de seguridad especiales debido al contenido de PHMB.
El tamaño del apósito depende de la superficie de la herida. El apósito debería sobrepasar la herida de 2 a 3 cm.
b) Abrir el envase estéril y retirar el apósito en condiciones asépticas. Retirar la película protectora de ambas caras. Ambas caras del apósito pueden colocarse sobre la herida.
c) En caso necesario, el apósito y el taponamiento pueden cortarse con una tijera estéril.
Aplicar el apósito sobre la herida, modelarlo y fijarlo con una cubierta secundaria adecuada (Suprasorb® P apósito de película, Suprasorb® P apósito de espuma).
d) Si se usa el taponamiento, plegarlo varias veces e introducirlo en la herida sin presionar. No llenar la herida por completo. Cubrir el taponamiento con un apósito secundario adecuado Suprasorb® P apósito de película, Suprasorb® P apósito de espuma).

3. Cambio de apósito:
El médico encargado del tratamiento determinará los intervalos en los que debe cambiarse el apósito/taponamiento antimicrobiano HydroBalance Suprasorb® X + PHMB, en función del estado de la herida (las experiencias clínicas actuales se encuentran en un máximo de 7 días).
a) Quitar el apósito secundario.
b1) Levantar el apósito antimicrobiano HydroBalance Suprasorb® X + PHMB cuidadosamente por un lado y, luego, retirarlo con cuidado de la herida.
b2) Retirar el taponamiento antimicrobiano HydroBalance Suprasorb® X + PHMB con cuidado de la herida.
c) Desechar el apósito o el taponamiento quitados de la herida (no reutilizar).
d) Limpiar la herida antes de colocar un apósito o taponamiento nuevos.

Medidas de precaución:
Si aparecen los síntomas siguientes, consulte con un médico o personal sanitario:
- cambios de color u olor de la herida
- deterioro del proceso de cicatrización de la herida
- signos clínicos de una infección

El producto no debe utilizarse en caso de intolerancia conocida o alergia a uno o más componentes del producto.
El apósito no debe usarse como única medida terapéutica para el tratamiento de heridas infectadas; debe complementarse con fármacos conforme a los protocolos locales, según el criterio del médico encargado del tratamiento.
Deben tenerse en cuenta las posibles interacciones entre el PHMB catiónico y el ácido hialurónico aniónico, así como con otros productos aniónicos, pues la fijación de los iones permite reducir el efecto antimicrobiano del PHMB.

Si es necesario realizar un uso continuado, Suprasorb® X + PHMB puede utilizarse en casos aislados durante más de 30 días. El médico encargado del tratamiento decide sobre la utilización durante el embarazo, en mujeres lactantes o en niños de hasta dos años. No obstante, esto no es recomendable, pues en la actualidad no se dispone de experiencias clínicas documentadas con el producto a este respecto.

En caso de que el apósito se seque, debe rehidratarse suficientemente durante al menos 10 minutos antes de aplicarlo.

pt Instruções de utilização

Descrição do produto:
Os pensos/tamponamentos antimicrobianos HydroBalance Suprasorb® X + PHMB têm um efeito antimicrobiano sobre um largo espectro de microrganismos patogénicos*. In vitro foi possível demonstrar uma libertação muito rápida e quase completa da polihexanida (PHMB) do penso após 24 horas. Conforme o estado da ferida, os produtos podem ainda adicionar humidade ou absorver excesso em exsudado da ferida. Consegue-se assim obter um ambiente húmido na ferida. A troca do penso é atraumática. O material permite uma adaptação simples à forma e profundidade de cada ferida. Por isso, os produtos são também especialmente adequados para regiões de difícil acesso no corpo. As propriedades positivas do penso da ferida previnem uma aderência à ferida ou a um penso secundário. O ambiente húmido com efeito refrescante é sentido pelos pacientes como agradável e analgésico.

Os produtos vêm embalados separadamente e esterilizados por radiação.

Os pensos/tamponamentos antimicrobianos HydroBalance Suprasorb® X + PHMB destinam-se a uma única utilização e não devem ser re-esterilizados.

* Espectro de microrganismos patogénicos comprovado in vitro, consulte a 1ª coluna das instruções de utilização

Composição do produto:
Os pensos/tamponamentos antimicrobianos HydroBalance Suprasorb® X + PHMB são compostos por celulose, água e 0,3 % de polihexametileno biguanida (PHMB/polihexanida).

Finalidade:
Os pensos/tamponamentos antimicrobianos HydroBalance Suprasorb® X + PHMB destinam-se à cicatrização de feridas ou à redução da área de feridas em risco de infeção ou infetadas.

Indicações:
Os pensos/tamponamentos antimicrobianos HydroBalance Suprasorb® X + PHMB podem ser usados em feridas em risco de infeção ou infetadas

- com exsudação fraca a média,
- superficiais ou
- profundas, em
  - úlceras arteriais e venosas
  - úlceras diabéticas
  - úlceras de pressão
  - queimaduras superficiais de 2.º grau
  - feridas cirúrgicas pós-operatórias
  - transplantes de pele
  - locais dadores de enxerto de pele de espessura parcial
  - feridas por esfolamento, lacerações

Contraindicações:
- queimaduras de 3.º grau
- não usar em caso de conhecida hipersensibilidade à PHMB (polihexanida)
- feridas com cartilagens expostas (cartilagem hialina)

Efeitos secundários:
Em casos muito raros podem surgir incompatibilidades cutâneas ou alergias. Foram descritos casos esporádicos de choque anafilático ou dores no início do tratamento.

Instruções de utilização:
1. Preparação da ferida:
Limpe a ferida cuidadosamente. A pele circundante deverá ficar limpa e seca.

2. Aplicação do penso:
a) A PHMB existente no penso não torna necessárias instruções de segurança especiais para a aplicação do penso.
O tamanho do penso a usar depende da área da ferida. O penso deverá exceder a ferida em pelo menos 2 a 3 cm em todos os lados.
b) Abra a embalagem estéril e retire o penso em condições assépticas. Retire a película de proteção de ambos os lados. Qualquer dos lados do penso pode ser aplicado na ferida.
c) Se necessário, o penso ou tamponamento pode ser recortado com uma tesoura esterilizada.
Aplique o penso sobre a ferida, molde-o à superfície e fixe com uma cobertura secundária adequada (Suprasorb® P penso de película, Suprasorb® P penso de espuma).
d) Para usar o tamponamento, dobre-o várias vezes e aplique-o na ferida sem pressionar. Não preencha completamente o espaço da ferida. Cubra o tamponamento com um penso secundário apropriado (Suprasorb® P penso de película, Suprasorb® P penso de espuma).

3. Mudança de penso:
O intervalo a observar para a renovação dos pensos / tamponamentos antimicrobianos HydroBalance Suprasorb® X + PHMB será definido pelo médico, de acordo com o estado da ferida (a experiência clínica anterior está no intervalo até 7 dias).
a) Retire o penso secundário.
b1) Levante com cuidado o penso antimicrobiano HydroBalance Suprasorb® X + PHMB de um lado, e em seguida tire-o delicadamente da ferida.
b2) Tire cuidadosamente o tamponamento antimicrobiano Suprasorb® X + PHMB deve ser extraído com delicadeza da ferida.
c) Elimine imediatamente o penso ou tamponamento retirado (não reutilizar).
d) Antes da aplicação de um novo penso ou tamponamento, limpe a ferida.

Precauções:
Consulte um médico ou enfermeiro, no caso de surgirem quaisquer dos seguintes sintomas:
- alteração na cor e/ou no odor da ferida
- estagnação do processo de cicatrização
- sinais clínicos de infeção

Em caso de incompatibilidade conhecida ou de uma alergia a uma ou mais substâncias constituintes o produto não deve ser usado.
No tratamento de feridas infetadas não se deve considerar o penso como única medida terapêutica, mas pelo contrário, de acordo com a avaliação do médico assistente, esta deve ser complementada com uma terapia medicamentosa em conformidade com os protocolos clínicos locais.
Devem ser consideradas possíveis reações entre a PHMB catiónica e o ácido hialurónico aniónico, bem como outros produtos aniónicos, visto que o efeito antimicrobiano da PHMB pode ser reduzido através da ligação dos iões.

Em caso de aplicação contínua, Suprasorb® X + PHMB pode ser utilizado durante mais de 30 dias em casos individuais. Cabrá ao médico assistente decidir sobre a utilização durante a gravidez, em mulheres lactantes, bem como em crianças até aos dois anos de idade. Contudo, isto não é recomendável, uma vez que não existem atualmente experiências clínicas documentadas sobre o produto.

Se o penso secar, o penso deverá ser sujeito a uma reidratação com um tempo de atuação mínimo de 10 minutos antes da sua remoção.

it Istruzioni per l'uso

Descrizione del prodotto:
La medicazione antimicrobica Suprasorb® X+ PHMB HydroBalance in compressa/tampone svolge un'azione antimicrobica contro un ampio spettro di agenti patogeni*. È stato possibile documentare in vitro il rapidissimo e quasi completo rilascio di polihexanide (PHMB) dalla medicazione dopo 24 ore. Inoltre, a seconda delle condizioni della ferita, la medicazione può cedere umidità o assorbire l'essudato in eccedenza. In tal modo viene a crearsi l'ambiente umido per la ferita. La sostituzione della medicazione risulta atraumatica. Il materiale si adatta facilmente alla forma e alla profondità della ferita. Per questi il prodotto è particolarmente adatto anche per zone del corpo difficili da medicare. Le proprietà cationiche della medicazione ne contrastano l'adesione alla ferita o alla medicazione secondaria. L'ambiente umido con effetto rinfrescante viene percepito dai pazienti come piacevole e in grado di alleviare il dolore.

Ciascun prodotto è imballato singolarmente in confezione sterile e sterilizzato a raggi gamma.

La medicazione antimicrobica Suprasorb® X + PHMB HydroBalance in compressa/tampone è esclusivamente monouso e non può essere risterilizzata.

* Per lo spettro degli agenti patogeni documentato in vitro vedere la 1ª colonna delle istruzioni per l'uso

Composizione del prodotto:
La medicazione antimicrobica Suprasorb® X+ PHMB HydroBalance in compressa/tampone è composta da cellulosa, acqua e polifesametilenbiguanide (PHMB/polieasanide) allo 0,3%.

Uso previsto:
La medicazione antimicrobica Suprasorb® X+ PHMB HydroBalance in compressa/tampone è impiegata per la guarigione o la riduzione della superficie delle ferite infette o a rischio di infezione.

Indicazioni:
La medicazione antimicrobica Suprasorb® X+ PHMB HydroBalance in compressa/tampone può essere utilizzata per le ferite infette o a rischio di infezione in caso di:

- ferite con essudato da scarso a moderato,
- superficiali o
- profonde, in caso di
  - ulcere arteriose e venose
  - ulcere diabetiche
  - ulcere da decubito

* Vedere testo/esperienze in vitro, vedi 1. colonna istruzioni/consigli

Produktbeschreibung:
Suprasorb® X + PHMB antimikrobielle Hydrofaserverbände/-wundtampons/-wundtampons kommen worden toegepast bij wonden met infectiegevaar of geïnfecteerde wonden als deze

- licht tot matig exsuderend,
- oppervlakkig of
- diep zijn, en bij
  - arteriële en veneuze ulcera
  - diabetische ulcera
  - decubitus
  - oppervlakkige tweedegraads brandwonden
  - postoperatieve chirurgische wonden
  - huidtransplantaties
  - split-skin-afnameplekken
  - schaafwonden, laceraties

Contraindicaties:
- derdegraads brandwonden
- bij bekende overgevoeligheid voor PHMB (polyhexanide) niet gebruiken
- wonden met blootliggend kraakbeenweefsel (hyaliene kraakbeen)

Bijwerkingen:
In zeer zeldzame gevallen kunnen overgevoeligheid van de huid of allergieën optreden. Er zijn uitzonderingsgevallen van een anafylactische shock of pijn aan het begin van de behandeling beschreven.

Gebruiksinstructies:
1. Voorbereiding van de wond:
Reinig de wond zorgvuldig. De omringende huid moet schoon en droog zijn.

2. Aanleggen van het wondverband:
a) Bijzondere veiligheidsinstructies voor het aanleggen van het wondverband vanwege het aanwezige PHMB zijn niet nodig. Het formaat van het verband wordt afgestemd op het wondoppervlak. Het verband moet de wond 2-3 cm overlappen.
b) Open de sterile verpakking en haal het verband er onder aseptische omstandigheden uit. Verwijder de beschermfolie aan beide zijden. Het verband kan met beide zijden op de wond worden gelegd.
b) Indien nodig kunnen het wondverband en de wondtampon met een steriele schaar op maat worden gekniptt.
Leg het wondverband op de wond, modelleer het en fixeer het met een geschikte secundaire afdekking (Suprasorb® P Rollenverband, Suprasorb® P schuimverband).
d) Indien u de wondtampon gebruikt, vouwt u deze meerdere keren en brengt u deze los aan in de wond. Vul de wond niet helemaal op. Dek de wondtampon af met een geschikt secundair verband (Suprasorb® P folieverband, Suprasorb® P schuimverband).

3. Verbandwissel:
De behandelende arts bepaalt op basis van de wondtoestand het welke intervallen de Suprasorb® X + PHMB antimicrobiële HydroBalance-wondverbanden-tampons moeten worden vernieuwd (klinische ervaringen tot nu toe vallen binnen een bereik van maximaal 7 dagen).
a) Verwijder het secundaire verband.
b1) Til het Suprasorb® X + PHMB antimicrobiële HydroBalance-wondverband aan één kant voorzichtig op en trek het wondverband daarna behoedzaam van de wond af.
b2) Trek de Suprasorb® X + PHMB antimicrobiële HydroBalance-wondtampon behoedzaam uit de wond.
c) Gooi het verwijderde wondverband of de wondtampon weg (gebruik deze niet opnieuw).
d) Reinig de wond voordat u opnieuw een wondverband of wondtampon aanbrengt.

Voorzorgsmaatregelen:
Wend u tot een arts of verpleegkundige als de volgende symptomen zich voordoen:
- verandering van kleur en/of geur van de wond
- stagnerende wondgenezing
- klinische tekenen van een infectie

Bij een bekende overgevoeligheid of allergie voor een of meer van de bestanddelen mag het product niet worden gebruikt.
Bij de behandeling van geïnfecteerde wonden mag het wondverband niet als enige therapeutische maatregel worden ingezet, maar moet dit naar beoordeling van de behandelende arts in overeenstemming met de lokale klinische protocollen worden aangevuld met een medicamenteuze behandeling.
Er moet worden gelet op een eventuele wisselwerking tussen het kationische PHMB en anionische hyaluronzuren en andere anionische producten, omdat het antimicrobiële effect van het PHMB verlaagd kan worden door de binding van de ionen.

Bij continu gebruik kan Suprasorb® X + PHMB in individuele gevallen meer dan 30 dagen worden gebruikt.
De behandelend arts beslaat of het product wordt gebruikt tijdens de zwangerschap, bij vrouwen die borstvoeding geven of bij kinderen tot de leeftijd van twee jaar. Dit wordt echter niet aanbevolen, omdat er hiervoor op dit moment nog geen klinische ervaringen met het product zijn.

Als het verband opdroogt, moet een afdoende rehydratie plaatsvinden met een inwerktijd van minstens 10 minuten voordat het verband wordt verwijderd.

da Brugsanvisning

Produktbeskrivelse:
Suprasorb® X + PHMB antimikrobielle HydroBalance-sårbandager / -tamponader virker antimikrobielt over for et bredt spektrum af bakterier*. In vitro kunne der efter 24 t påvises en meget hurtig og næsten fuldstændig frigivelse af polihexanid (PHMB) fra sårkompressen. Desuden kan produkterne, afhængig af sårets tilstand, afgive fugt til såret eller optage overskydende eksudat. Således skabes et fugtigt sårmiljø. Bandageskift foregår atraumatisk. Materialet tilpasser en enkel tilpasning til den pågældende sårform og sårdybde. Produkterne er derfor også egnede til de områder på kroppen, som er vanskelige at behandle. Sårbandagens positive egen

cs Návod k použití

Popis výrobku:
Suprasorb® X + PHMB antimikrobiální Hydrofalinové obvazy na rány / tamponády Hydrofalinové pásobia antimikrobiálne proti širokému spektru činidiel, vrátane spektra Pseudomonas aeruginosa. In vitro bolo možné preukázať veľmi rýchle a takmer úplné usmrtenie polyhexanidu PHMB v krátkom čase (24 h). Okrem toho môžu steny vrstvy v závislosti od stavu rany odnevzdávať rane vlhkosť alebo absorbovať nadbytočný exsudát. Vytvára sa tým vlhké prostredie rany. Výmena obvazu je atraumatická. Materiál umožňuje jednoduché prispôsobenie konkrétnemu tvaru a hĺbke rany. Tieto výrobky sa preto mimoriadne hodia aj pre tie miesta na tele, ktoré sa ťažko ošetrujú. Pozitívne vlastnosti krytia na ranu bránia zlepšeniu v ranu alebo so sekundárnym obvazom. Vlhké prostredie rany s chladivým účinkom urmôjú pacienti ako príjemné a liečivé.

Výrobky sú jednotlivo sterilne zabalené a sterilizované žiarením.

Suprasorb® X + PHMB antimikrobiálny Hydrofalinové obvazy na rány / tamponády Hydrofalinové sú určené len na jednorazové použitie a nesmú sa opätovne sterilizovať.

* Preukázané spektrum chorobodpotných zárodkov in vitro pozri 1. stĺpec návodu napravo/hore

Zloženie výrobku:
Suprasorb® X + PHMB antimikrobiálny obvazy na rany/ tamponády Hydrofalinové sa skladajú z celulózy, vody a 0,3% polyhexametylénbiguanidu (PHMB/polyhexanid).

Stanovení účelu:
Suprasorb® X + PHMB antimikrobiálny Hydrofalinové obvazy na rány / tamponády slúžil k hojeniu nebo zmenšení plochy ran s rizikem infekce nebo infikovaných ran.

Indikace:
Suprasorb® X + PHMB antimikrobiálny Hydrofalinové obvazy na rány / tamponády mohou být použity na rány s rizikem infekce nebo infikované rány, pokud jsou

- slabě až středně exsudující

- povrchové nebo

- hluboké, v případě

- arteriálních a venózních vředů
- diabetických vředů
- dekubitálních vředů
- povrchových popáleninách 2. stupně
- poopečeních chirurgických ran
- kožních transplantátů
- míst odběru kožních transplantátů
- odlitenin, lacerace

Kontraindikace:
- popáleniny 3. stupně
- nepoužívat v případě přecitlivělosti na PHMB (polyhexanid)
- rány s obnažením chrupavčitou tkání (hyalinní chrupavka)

Vedlejší účinky:
Velmi zřídka může dojít k podráždění kůže nebo k alergii. Jsou popsány ojedinělé případy anafylaktického šoku nebo bolesti na začátku léčby.

Pokyny k použití:
1. Příprava rány:
Kůže perilézi vyčistěte. Okolní kůže by měla být čistá a suchá.

2. Přiložení obvazu na ránu:
a) Při přikládání obvazu na ránu není kvůli obsahu PHMB nutné dodržovat žádné zvláštní bezpečnostní pokyny.
Veškeré obvazy se připojování nosného rámu. Obvaz by měl ránu překrývat o 2–3 cm.
b) Otevřete sterilní obal a vyjměte obvaz za aseptických podmínek. Odstraňte ochranný film na obou stranách. Obvaz je možné přiložit na ránu oběma stranami.
c) V případě potřeby lze obvaz na ránu a tamponádu přistřihnout sterilními nůžkami.
Přistřihněte obvaz na ránu, vyhněte se zafixujte vhodným sekundárním krytím (Suprasorb® F fólové kryti, Suprasorb® P pěnové kryti).
d) Při použití tamponády z nekolikrát složte a volně vložte do rány. Ránu újmě nevyplňujte. Tamponádu přikryjte vhodným sekundárním obvazem (Suprasorb® F fólové kryti, Suprasorb® P pěnové kryti).

3. Výměna obvazu:
Interval výměny v noční je třeba Suprasorb® X + PHMB antimikrobiálního obvazy na zaryt tamponády Hydrofalinové tamponádu opatrně vyjměte z rány.
a) Odstraňte sekundární krytí.
b1) Suprasorb® X + PHMB antimikrobiálny obvaz na ranu nebo jeho zbytky opatrně nadvihněte a potom opatrně stáhněte z rány.
b2) Suprasorb® X + PHMB antimikrobiálny Hydrofalinové tamponádu opatrně vyjměte z rány.
c) Odstraňte veškeré sekundární krytí.
d) Před přiložením dalšího obvazu nebo tamponády ránu vyčistěte.

Preventivní opatření:
Vyvarujte se následujících symptomy, obráťte se na lékaře nebo zdravotníka:
- změna zabarvení a/nebo zápach rány
- stagnující hojení rány
- klinické známky infekce

Při známé neposlušenosti nebo alergii na jednu nebo více obsažených látek se výrobek nesmí používat.
Při těžké infekovaných ran nemůžu obvaz na rány sloužit jako jediné terapeutické opatření, ale měl by být na základě odpovídající odběr mikrobiologické vzorky a/nebo jiné diagnostické metody.
Může docházet k vzájemnému působení mezi kationovým PHMB a anionovými kyselinou hyaluronovou a jinými aniontovými sloučeninami, proto se vyvarujte kontaktu mezi nimi.
Při delším používání, protože vazba iontů může snížit antimikrobiální účinek PHMB.

Pokud se používá nepřetržitě, může být Suprasorb® X + PHMB v jednotlivých případech použitím déle než 30 dní.
O použití během těhotenství, v kojicích žen a u dětí do dvou let věku rozhoduje ošetřující lékař. To se však nedoporučuje, protože u produktu nejsou v současné době dostatečný žádné klinické zkušenosti.

Pokud obvaz přichne k ráně, je nutné před jeho odstraněním zajistit dostatečnou nehydratace s dobou působení minimálně 10 minut.

Fólaminátu alkalinazát ostéte a Suprasorb® X + PHMB egyéb esetekben több, mint 30 napon át alkalmazható.
Terhes és szoptató nőkkel, valamint 2 év alatti gyermekeknél történő alkalmazásáról a kezelőorvos dönt. Ez azonban nem ajánlott, mivel e területeken jelenleg nem állnak rendelkezésre klinikai tapasztalatok a termékkel.

Ha a kötszer kiszárad, eltávolítása előtt legalább 10 percen hatóidejű megfelelő rehidratálnak kell tartánie.

sk Návod na použitie

Popis výrobku:
Suprasorb® X + PHMB antimikrobiálne obväzy na rany/ tamponády Hydrofalinové pôsobia antimikrobiálne proti širokému spektru chorobotvorných zárodkov*. In vitro bolo možné preukázať veľmi rýchle a takmer úplné usmrtenie polyhexanidu PHMB z krytia na ranu po 24 h. Okrem toho môžu steny vrstvy v závislosti od stavu rany odnevzdávať rane vlhkosť alebo absorbovať nadbytočný exsudát. Vytvára sa tým vlhké prostredie rany. Výmena obvazu je atraumatická. Materiál umožňuje jednoduché prispôsobenie konkrétnemu tvaru a hĺbke rany. Tieto výrobky sa preto mimoriadne hodia aj pre tie miesta na tele, ktoré sa ťažko ošetrujú. Pozitívne vlastnosti krytia na ranu bránia zlepšeniu v ranu alebo so sekundárnym obväzom. Vlhké prostredie rany s chladivým účinkom urmôjú pacienti ako príjemné a liečivé.

Výrobky sú balené jednotlivo a sterilne a sú sterilizované ožiarením.

Suprasorb® X + PHMB antimikrobiálne obväzy na rany/ tamponády Hydrofalinové sú určené len na jednorazové použitie a nesmú sa opätovne sterilizovať.

* Preukázané spektrum chorobodpotných zárodkov in vitro pozri 1. stĺpec návodu napravo/hore

Určené použitie:
Suprasorb® X + PHMB antimikrobiálne obväzy na rany/ tamponády Hydrofalinové slúži na hojenie rany alebo redukciu plochy rany pri ranách ohrozených infekciou alebo infikovaných ranách.

Indikácie:
Suprasorb® X + PHMB antimikrobiálne obväzy na rany/ tamponády Hydrofalinové sa môžu používať na rany ohrozené infekciou alebo infikované rany, ak sú

- slabo až stredne silno exsudujúce,

- povrchové alebo

- hlboké, pri

- arteriálnych a venóznych vredoch
- diabetických vredoch
- dekubitálnych vredoch
- povrchových popáleninách 2. stupňa
- popooperačných chirurgických ranách
- kožných transplantátoch
- miestach odberu kožných štepov
- odlamkových, laceráciách

Kontraindikácie:
- popáleniny 3. stupňa
- hypersenzitivita na PHMB (polyhexanid)
- rany s odhalenými chrupavkovými tkanivom (hyalínna chrupavka)

Vedľajšie účinky:
Zriedkavo môže dôjsť k podráždeniu kože alebo k alergii. Boli popísané ojedinelé prípady anafylaktického šoku alebo bolesti na začiatku liečby.

Pokyny na použitie:
1. Príprava rany:
Ranu odstráňte čistú a suchú. Okolitá koža má byť čistá a suchá.

2. Priloženie obväzu na ranu:
a) Špeciálne bezpečnostné pokyny z dôvodu obsahnutého PHMB nie sú pri priložení obväzu na ranu potrebné.
Veľkosť obväzu sa vyšší presahovať rámu. Obväz by mal ranu presahovať o 2–3 cm.
b) Otvorte sterilný obal a vyjmite obväz za aseptických podmienok. Odstráňte ochranný film na oboch stranách. Obväz je možné priložiť na ranu oboma stranami.
c) V prípade potreby je obväz na ranu a tamponádu prístrihnúť sterilnými nožnicami.
Prístrihnite obväz na ranu, vyhnajte a zafixujte vhodným sekundárnym krytím (Suprasorb® F fólové kryti, Suprasorb® P pěnové kryti).
d) Pri použití tamponády ju nikdy nestláčajte a voľne vložte do rany. Ranu újmě nevyplňujte. Tamponádu prikryjte vhodným sekundárnym obväzom (Suprasorb® F fólové kryti, Suprasorb® P pěnové kryti).

3. Výmena obväzu:
Interval výmeny v nočnej je nutné Suprasorb® X + PHMB antimikrobiálny obväzy na zaryt tamponády Hydrofalinové tamponádu opatrne vyjmite z rany.
a) Odstráňte sekundárne krytie.
b1) Suprasorb® X + PHMB antimikrobiálny obväz na ranu alebo jeho zbytky opatrne nadvihnite a potom opatrne stiahnite z rany.
b2) Antimikrobiálnu tampónadu Suprasorb® X + PHMB Hydrofalinové opatrne vyberte z rany.
c) Odstráňte všetky sekundárne krytie.
d) Pred priložením ďalšieho obväzu na ranu alebo ďalšej tampónady ranu vyčistite.

Preventívne opatrenia:
Ak sa vyskytnú nasledujúce symptómy, obráťte sa na lekára alebo ošetrovateľa:
- zmena zafarbenia a/alebo pachnúca rana
- stagnujúci liečení rany
- klinické znaky infekcie

Pri známej neposlušnosti alebo alergii na jednu alebo viacero obsiahnutých látok sa výrobok nesmie použiť.
Pri ošetrovaných ranách s infekciou sa nesmie použiť ako jediné liečebné opatrenie, ale podľa vzájomnej odpovedajúce vzorky a/alebo iné diagnostické metódy.
Môže dochádzať k vzájomnému pôsobeniu medzi kationovým PHMB a aniontovými kyselinou hyalurónovou a inými aniontovými zlúčeninami, preto sa vyvarujte kontaktu medzi nimi.
Pri dlhšom používaní, pretože väzba iontů môže znížiť antimikrobiálny účinok PHMB.

Pokiaľ sa používa nepretržite, môže byť Suprasorb® X + PHMB v jednotlivých prípadoch použitím dlhšie než 30 dní.
O použití počas tehotenstvi, v kojících žien a u detí do dvou let veku rozhoduje ošetrujúci lekár. To sa však neodporúča, pretože u produktu nejsou v současné době dostatečný žádné klinické zkušenosti.

Pokiaľ obväz priľne k rane, je nutné pred jeho odstránením zaistiť dostatočnou nehydratáciu s dobou pôsobení minimálne 10 minút.

sa to však, pretože momentálne k tomu neexistujú žiadne zdokumentované klinické skúsenosti s produktom.

Ak by obväz priľnul, musí sa pred jeho odstránením uskutočniť postačujúca rehydratácia s minimálnou dobou pôsobenia 10 minút.

hu Használati utasítás

Termékleírás:
A Suprasorb® X + PHMB antimikrobiális kötszer / tampon kórokozók széles spektrumával szemben rendelkezik antimikrobiális hatással*. In vitro, 24 óra után a polihexanid (PHMB) nagyon gyors és szinte teljes feloldódása volt kimutatható a sebfelületről. A termék a seb állapotától függően folyadékot tud tasdni a sebnek, vagy képes felvenni a felesleges váladékot. Ez nedves sebkörnyezetet biztosít. A kötszer cseréje atraumatikusan történik. Az anyaga lehetővé teszi a mindenféle sebformához és sebmélységhez való illeszkedést. Ezért a termék különösen alkalmas nehezen ellátható testtájak kezelése esetén is. A sebből pozitív tulajdonságai gátolják a sebbe vagy a másodlagos kötésbez történő nyugalást. A nedves sebkörnyezetet és a hűtő hatást a betegek kényelmesnek és fájdalmat enyhítőnek találják.

A termék egyesével van sterilen csomagolva és besugárzással van sterilizálva.

A Suprasorb® X + PHMB antimikrobiális kötszer / tampon nyílt vagy károsodott esetén és nem szabad újrasterilizálni.

* Az in vitro ismert kórokozóspektrum a használat utasítás 1. oszlopában található.

Termékösszetétel:
A Suprasorb® X + PHMB antimikrobiális Hydrofalinové kötszer / tampon cellulózból, vízből és 0,3% poli-hexametilén-biguanidból (PHMB/polihexanid) áll.

A termék rendeltetése:
A Suprasorb® X + PHMB antimikrobiális Hydrofalinové kötszer / tampon fertőzés veszélyének kitett vagy fertőzött sebek gyógyulására vagy a sebek felületének csökkentésére szolgál.

Javallatok:
A Suprasorb® X + PHMB antimikrobiális Hydrofalinové kötszer / tampon fertőzés veszélyének kitett vagy fertőzött sebekkel alkalmazható, ha a seb

- enyhén vagy közepesen váladékozó,

- felületi vagy

- mély, és tipusi tekintve

- artériás vagy vénás fekélyek
- diabéteszes fekélyek
- nyomási fekélyek
- felületi, másodfokú égések
- posztoperatív sebészeti sebek
- bőrátültetések
- részvastag bőr vétel helyek
- horzsolt vagy szakított sebek esetén

Ellenjavallatok:
- hamadfokú égések
- ne használja polihexanidal (PHMB) szemberi ismert túlérzékenység esetén
- szabadon lévő porcszövettel (hialinporc) rendelkező sebek

Mellékhatások:
Nagyon ritka esetekben bőrirritációt vagy allergiát okozhat. A szakirodalomban egy-egy esetet írtak le, melyekről a kezelés kezdetén egy anafilaktikus sokk, illetve fájdalom lépett fel.

Használati útmutatás:
1. A seb előkészítése:
A sebet gondosan meg kell tisztítani. A sék környékén a bőr legyen tiszta és száraz.

2. A kötszer felhelyezése:
a) A tartalmában PHMB miatt a kötszer felhelyezésekor nem szükségesek különleges biztonsági útmutatások.
A kötszer mérete a sebfelület nagyságától függjön.
A kötszernek 2-3 cm-rel kell ernie a sebet.
b) Nyissa fel a sterilcsomagolást és aszeptikus körülmények mellett vegye ki a kötszert. Távolítsa el mindkét oldalról a védőfóliát. A kötszer bármelyik oldalával a sebre helyezhető.
c) Igény esetén a kötszer és a tampon steril ollóval méretre vágható. Helyezze kötszert a sebre úgy, hogy az ne megtelelő másodlagos fedéssel (pl. Suprasorb® F fóliakötszerrel, Suprasorb® P habkötszerrel) rögzítse.
d) A tampon használatát esetén távolítsa hasza összes laza részecske a sebről. Ne tűzze le teljesen a sebet. A tampont egy arra alkalmas másodlagos kötéssel (pl. Suprasorb® F fóliakötszerrel, Suprasorb® P habkötszerrel) fedje le.

3. Kötéscsere:
A Suprasorb® X + PHMB antimikrobiális Hydrofalinové kötszer / tampon cseréjének ajánlott a kezelőorvos a seb állapota alapján határozza meg a kötözés kívánt időközét. Az átlagos kezelési időtartam 3 nap.
a) Távolítsa el a másodlagos kötést.
b1) Az egyik oldalán óvatosan emelje fel a Suprasorb® X + PHMB antimikrobiális Hydrofalinové kötszert, majd óvatosan távolítsa el a sebből.
b2) Óvatosan távolítsa el a Suprasorb® X + PHMB antimikrobiális Hydrofalinové tampont a sebből.
c) Az eltávolított kötszert vagy tampont ártalmatlanítsa (ne használja újra).
d) Tisztítsa ki a sebet újabb kötszer vagy tampon felhelyezése előtt.

Óvintézkedések:
Kérjük, az alábbi tünetek felfedése esetén forduljon orvoshoz vagy szakápzettohoz:
- megváltozott színű és/vagy szagú sebváladékozás
- stagnáló sebgyógyulás
- fertőzés klinikai jele

A terméket valamely összetevőjével szembeni ismert érzékenység vagy allergia esetén nem szabad használni.
Fertőzött sebek kezelése esetén ne alkalmazza a kötszert egyedül második önálló eszközként. Ilyenek a kiszáradással járó sebek megfelelően, a helyi klinikai protokollokban megfelelő gyógyszeres kezelésnek kell kiegészítenie.
Figyelemmel kell venni a kationos PHMB és az anionos hialuronsav, valamint a más anionos termékek közötti kölcsönhatásokat, mivel ezek kémiai kötődése csökkentheti a PHMB antimikrobiális hatását.

pl Instrukcja użycia

Opis produktu:
Antybakteryjne Hydrofalinowe opatrunki/tamponady Suprasorb® X + PHMB mają działanie antybakteryjne i są skuteczne przeciwko szerokiemu spektrum bakterii.* W ramach badań in vitro wykazano bardzo szybkie i prawie całkowite zwolnienie polihesanidu PHMB z opatrunku po 24 godzinach. Dodatkowo, w zależności od stanu rany, produkty te mogą nawilżać ją lub wchłaniać nadmiar wysięku. Zapewnia to wilgotność w środowisku rany. Zmiana opatrunku następuje w sposób bezbolesny. Materiał umożliwia łatwe dopasowanie do danego kształtu i głębokości rany. Z tego względu produkty te nadają się również do stosowania w miejscach trudnych do zaopatrzenia. Pozytywne właściwości opatrunku nie pozwalają pojawieniu się rany lub opatrunku wtórnego. Wilgotne środowisko z efektem chłodzenia jest odbierane przez pacjentów jako przyjemne i łagodzące ból.

Produkty są pakowane pojedynczo w jałowych opakowaniach i sterylizowane promieniami gamma.

Antybakteryjne opatrunki/tamponady Suprasorb® X + PHMB nie powinny być sterylizowane.

* Spektrum aktywności drobnoustrojów odnosi się do przeciwnych kolumn in vitro, patrz 1. kolumna instrukcji użycia

Skład produktu:
Antybakteryjne Hydrofalinowe opatrunki/tamponady Suprasorb® X + PHMB składają się z celulozy, wody i 0,3% biguanidu polimetylenoheksylenowego (PHMB/polihesanid).

Zastosowanie:
Antybakteryjne Hydrofalinowe opatrunki/tamponady Suprasorb® X + PHMB służą do gojenia rany lub redukcji powierzchni ran zakażonych lub zagrożonych infekcją.

Wskazania:
Antybakteryjne Hydrofalinowe opatrunki/tamponady Suprasorb® X + PHMB mogą być stosowane na ranach zagrożonych infekcją lub zakażonych, jeśli są to rany

- o niewielkim lub średnim wysięku,

- powierzchowne lub

- głębokie, tj.

- owrzodzenia tętnicze i żylne
- owrzodzenia cukrzycowe
- odleżyny
- oparzenia powierzchowne 2. stopnia
- pooperacyjne rany chirurgiczne
- przeszczepy skóry
- miejsca pobrania skóry do przeszczepu
- otarcia, rozdarcia

Przeciwwskazania:
- oparzenia 3. stopnia
- nie stosować u osób z nadwrażliwością na PHMB (polihesanid)
- rany z odsłoniętą tkanką chrzęstną (chrząstka szklista)

Działania niepożądane:
Bardzo rzadko mogą wystąpić objawy niepożądanej skórnej lub alergii. W piśmiennictwie opisywano wstrząs anafilaktyczny lub bolesność na początku leczenia.

Wskazówki użycia:
1. Przygotowanie rany:
Staranne oczyścić rane. Otaczająca skóra powinna być czysta i sucha.

2. Nakładanie opatrunku:
a) Podczas nakładania opatrunku nie są konieczne szczególne środki bezpieczeństwa ze względu z zawartością PHMB.
Wielkość opatrunku należy od powierzchni rany. Opatrunek powinien wystawać 2-3 cm poza brzegi rany.
b) Otworzyć opakowanie jałowej i wyjąć opatrunek w warunkach zapewniających sterylność. Usunąć z obu stron warstwę ochronną. Opatrunek można nakłaść na rane obiema stronami.
c) W razie potrzeby można przyciąć opatrunek i tamponadę za pomocą sterylnych nożyczek.
Należy opatrunek na rane, wymodelować i przymocować za pomocą odpowiedniego opatrunku wtórnego (Suprasorb® F opatrunek foliowy, Suprasorb® P opatrunek piankowy).
d) W przypadku użycia tamponady należy ją wielokrotnie złożyć i luźno umieścić w ranie. Nie wypełniać nadmiernie ciasno całej rany. Przykryć tamponadę za pomocą odpowiedniego opatrunku wtórnego (Suprasorb® F opatrunek foliowy, Suprasorb® P opatrunek piankowy).

3. Zmiana opatrunku:
Częstotliwość zmiany antybakteryjnego Hydrofalinowe opatrunki/ tamponady Suprasorb® X + PHMB ustala lekarz prowadzący w zależności od stanu rany (dotychczasowe doświadczenia klinicznie obejmują zakres czasu do 7 dni).
a) Usunąć opatrunek wtórny.
b1) Ostrożnie unieść antybakteryjny Hydrofalinowe opatrunek Suprasorb® X + PHMB z jednej strony i następnie ostrożnie odkleić od rany.
b2) Ostrożnie wyciągnąć antybakteryjną Hydrofalinowe tamponadę Suprasorb® X + PHMB z rany.
c) Usunąć wszystkie opatrunki wtórne.
d) Przed nałożeniem kolejnego opatrunku lub tamponady należy oczyścić rane.

Środki ostrożności:
W przypadku wystąpienia następujących objawów należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki:
- zmiana barwy i/lub zapachu rany
- zagnijąca leczenia rany
- klinicznie oznaki infekcji

Nie stosować produktu przy znanej nietolerancji lub alergii na jeden lub kilka składników produktu.

- stagnujące leczenie rane
- klinični znaki okužbe

Ob znani neposlušnosti ali alergiji na eno ali več sestavin se zdravilo ne sme uporabljati.
Pri zdravljenju okuženih ran obloge za rane ne zadostujejo kot edini terapevtski ukrep, temveč po presoji odgovornega zdravnika terapijo razširi v skladu z lokalnimi kliničnimi protokoli.
Paziti je treba na možne interakcije med kationskim PHMB in anionsko hialuronsko kislino in drugi anionskimi izdelki, ker lahko vezava ionov zmanjša protimikrobnen učinek PHMB.

Pri neprekinjeni uporabi se Suprasorb® X + PHMB lahko v posameznih primerih uporablja več kot 30 dni.
O uporabi med nosečnostjo, pri doječih dojenkah in otrocih do dveh let odloča lečeči zdravnik. Vendar pa se to ne priporoča, ker dokumentiranih kliničnih izkušenj z izdelkom zaenkrat ni na voljo.

Če se obloga posuši, je potrebna rehidracija, ki mora delovati vsaj 10 minut, preden se obloga odstrani.

hr Upute za uporabu

Opis proizvoda:
Suprasorb® X + PHMB antimikrobni Hydrofalinove povoji za rane/ tamponade djeluju antimikrobno protiv širokog spektra mikroorganizama*. U in vitro uvjetima mogło se nakon 24 h pokazati vrlo brzo i gotovo potpuno oslobađanje polihesanida (PHMB) iz obloge za ranu. Uz to oni proizvodi mogu, ovisno o stanju rane, vlažiti ranu ili upiti prekomjerni eksudat. Time se ostvaruje vlažna okolina rane. Prekijanje je atraumatsko. Materijal omogućuje jednostavnu prilagodbu pojedinom obliku ili dubini rane. Ovi proizvodi su stoga također naročito prikladni za dijelove tijela koji se teško zbrinjavaju. Pozitivna svojstva obloge za ranu glavnu protiv njenog ljepljenja za ranu ili sekundarni povoj. Vlažnu okolinu s učinkom hlađenja pacijenti doživljavaju kao ugodno i ublažujuće.

Proizvodi su pojedinačno sterilno pakirani i sterilizirani su ionskim zračenjem.

Suprasorb® X + PHMB antimikrobne Hydrofalinove obloge za rane/ tamponade nemojte ponovno sterilizirati.

* Spektar potpunosti djelovanja in vitro, gl. 1. stupac vputa za korištenje

Sastava izdelka:
Suprasorb® X + PHMB protimikrobne Hydrofalinove obloge za rane / tamponade so sestavljene iz celuloze, vode in 0,3% poliheksametilen biguanida PHMB (polihesanid).

Namen:
Suprasorb® X + PHMB protimikrobne Hydrofalinove obloge za rane / tamponade so namenjene za celjenje ran ali zmanjšanje površin ran, ki so okužene ali jih okužbe ogrožajo.

Indikacije:
Suprasorb® X + PHMB protimikrobne Hydrofalinove obloge za rane / tamponade se uporabljajo pri ranah, ki so okužene ali jih okužbe ogrožajo, če

- je prisoten rahel do zmeren izcedek,

- so površinske ali

- globinske, pri

- arterijskih in venskih razjedah
- diabetičnih razjedah
- ponleženinah
- površinskih opeklinah 2. stopnje
- postoperativnih kirurških ranah
- presadnikih kože
- odjemnih mestih kože
- odlomkih, natrganinah

Kontraindikacije:
- opekline 3. stopnje
- ne uporabljati pri preobčutljivosti na PHMB (polihesanid)
- rane z izpostavljenim hrustančnim tkivom (steklasti hrustanec)

Neželeni učinki:
V zelo redkih primerih se lahko pojavijo preobčutljivost kože ali alergije. Poročajo o osamljenih primerih anafilaktičnega šoka ali bolečin ob začetku zdravljenja.

Navodila za uporabo:
1. Priprava rane:
Rano temeljito očistiti. Okolična koža naj bo čista in suha.

2. Namestitev obloge za rane:
a) Zaradi vsebovanega PHMB pri nameščanju obloge za rane posebni varnostni ukrepi niso potrebni.
Velikost obloge je odvisna od površine rane. Obloga mora rano prekrivati za 2-3 cm.
b) Odprite sterilno embalažo in pod aseptičnimi pogoji iz nje vzemite oblogo. Odstranite zaščitno folijo na obeh straneh. Obloga se na rano lahko položi z obeh strani.
c) Če je potrebno, lahko obloga za rane in tamponado prilagodite s sterilnimi škarjami.
Namestite obloge na rano, jo prilagodite in pritrdite z ustrezno drugotno krtino (Suprasorb® F filmska obloga, Suprasorb® P penasta obloga).
d) Če obloga uporabljate kot tamponado, jo enostavno večkrat prepognite in ohlapno vstavite v rano. Rane ne posesni zapolnit. Pokrijte tamponado z ustrezno drugotno oblogo (Suprasorb® F filmska obloga, Suprasorb® P penasta obloga).

3. Menjava obloge:
Časovne intervale, v katerih je Suprasorb® X + PHMB protimikrobne Hydrofalinove obloge za rane/ tamponade treba zamenjati, določi zdravnik glede na stanje rane (dosedanje klinične izkušnje kažejo v obdobju do 7 dni).
a) Odstranite drugotno krtino.
b1) Suprasorb® X + PHMB protimikrobne Hydrofalinove obloge za rane previdno dvignite na eni strani in jo nato nežno odstranite z rane.
b2) Suprasorb® X + PHMB protimikrobne Hydrofalinove obloge nežno izvlecite iz rane.
c) odstranjenu oblogo oziroma tamponado odstranite (ne ponovno uporabljajte).
d) Preden namestite novo oblogo ali tamponado, rane očistite.

Previdnostni ukrepi:
Obrnite se na zdravnika ali medicinsko osebje, če pride do naslednjih simptomov:
- spremenba barve in / ali vonja rane

Mjere predostrožnosti:
Molimo obratite se ljekniku ili drugom medicinskom osoblju u slučaju pojave sljedećih simptoma:
- promjena boje ili mirisa rane
- stagnirajuće cijeljenje rane
- klinički znakovi infekcije

U slučaju neposlušnosti ili alergije na jedan ili više sastojaka, proizvod se ne smije primjenjivati.
Prilikom liječenja inficiranih rana ovaj povoj za rane ne smije se primjenjivati kao jedina terapijska mjera, već se prema procjeni nadležnog liječnika treba dopuniti medikamentoznom terapijom sukladno lokalnim kliničkim protokolima.
Potrebno je obratiti pažnju na moguće interakcije između kationskog PHMB-a i anionske hijaluronske kiseline kao i drugih anionskih proizvoda, jer vezanje iona može smanjiti antimikrobno djelovanje PHMB-a.

Kod kontinuirane primjene se Suprasorb® X + PHMB može u pojedinačnim slučajevima primjenjivati duže od 30 dana.
O primjeni tijekom trudnoće, u dojilja te djece u dobi do dvije godine odlučuje nadležni ljekrik. Međutim, ta se primjena ne preporučuje, jer o njoj trenutno nema dokumentiranih kliničkih iskustava s ovim proizvodom.

Ako se povoj osuši, mora se provesti njegova dostatna rehidracija s vremenom djelovanja od najmanje 10 minuta prije uklanjanja povoja.

el Οδηγίες χρήσης

Περιγραφή προϊόντος
Οι αντιμικροβιακά επιθέματα τραύματος/ επιπωματισμού Hydrofalinoe Suprasorb® X + PHMB επιδεικνύουν αντιμικροβιακή δράση κατά ενός μεγάλου φάσματος παθογόνων μικροοργανισμών. Σε in vitro καταστάσεις με πολύ υψηλή συγκέντρωση μιας ουσίας, η οποία ονομάζεται πολυεξαμεθυλενοβιγουανίδη (PHMB/πολυεξανίδη), μπορεί να αποδειχθεί ότι μετά από 24 ώρες. Επιπλέον, τα προϊόντα μπορούν ανάλογα με την κατάσταση του τραύματος να απορροφούν υγρά από το τραύμα ή να απορροφήσουν περίσσεια εξιδρώματος. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα υγρό περιβάλλον στο τραύμα. Η αλλαγή του επιθέματος πραγματοποιείται χωρίς πόνο. Το υλικό επιτρέπει επίσης προσαρμογή στο σχήμα και στο βάθος του τραύματος. Το υγρό περιβάλλον στο τραύμα, καθώς και η δροσιστική δράση του, θεωρούνται από τους ασθενείς ως ευχάριστα και ανακουφιστικά.

Τα προϊόντα είναι συσκευασμένα μεμονωμένα σε αποστειρωμένη συσκευασία και αποστειρώνονται με ακτινοβολία.

Τα προϊόντα Suprasorb® X + PHMB αντιμικροβιακά Hydrofalinoe δεν πρέπει να αποστειρώνονται ξανά.

* Φάσμα παθογόνων in vitro καταδεικνύεται, βλ. τη στήλη των οδηγιών χρήσης

Σύνθεση προϊόντος
Οι αντιμικροβιακά επιθέματα τραύματος/ επιπωματισμού Hydrofalinoe Suprasorb® X + PHMB αποτελούνται από κυτταρίνη, νερό και 0,3 % πολυεξαμεθυλενοβιγουανίδη (PHMB/πολυεξανίδη).

Προβλεπόμενη χρήση:
Οι αντιμικροβιακά επιθέματα τραύματος/ επιπωματισμού Hydrofalinoe Suprasorb® X + PHMB χρησιμεύουν στην επούλωση τραυμάτων ή στη μείωση της επιφάνειας τραυμάτων που παρουσιάζουν κίνδυνο λοίμωξης ή λοίμωξη.

Ενδείξεις:
Οι αντιμικροβιακά επιθέματα τραύματος/ επιπωματισμού Hydrofalinoe Suprasorb® X + PHMB μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τραύματα που παρουσιάζουν κίνδυνο λοίμωξης ή λοίμωξη, όταν αυτά είναι

- ελαφρού ή μέτριο εξιδρώματος,

- επιφανειακού ή

- βαθιά, σε

- αρτηριακά και φλεβικά έλκη
- διαβητικά έλκη
- κατακλίσεις
- επιφανειακά εγκαύματα 2ου βαθμού
- μετεγχειρητικά τραύματα
- δότες δερμάτινων μοσχευμάτων
- θέσεις λήψης δερματόνων μοσχευμάτων μερικού πάχους
- εκδορές, ρήξεις

Αντενδείξεις:
- εγκαύματα 3ου βαθμού
- μην τα χρησιμοποιείτε σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας στην PHMB (πολυεξανίδη)
- τραύματα με εκτεθειμένο χόνδρο από ύαλινη χόνδρο

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν δερματικές αντιδράσεις ή αλλεργίες. Έχουν περιγραφεί μεμονωμένες περιπτώσεις αναφυλακτικής καταπληξίας ή άλγους κατά την έναρξη της θεραπείας.

Υποδείξεις εφαρμογής:
1. Προετοιμασία του τραύματος
Καθαρίστε τα τραύματα προσεκτικά. Το περιβάλλον δέρμα θα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό.

2. Τοποθέτηση του επιθέματος τραύματος:
α) Δεν απαιτούνται ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας λόγω της περιεχόμενης PHMB κατά την τοποθέτηση του επιθέματος τραύματος.
Το μέγεθος του επιθέματος είναι ανάλογο της επιφάνειας του τραύματος. Ο επίδεσμος θα πρέπει να υπερκαλύπτει τα τραύμα κατά 2 – 3 cm.
β) Ανοίξτε την αποστειρωμένη συσκευασία και αφαιρέστε τον επίδεσμο υπό αποστειρές συνθήκες. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και από τις δύο πλευρές. Ο επίδεσμος μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές.
γ) Αν χρειάζεται, ο επίδεσμος τραύματος ή επιπωματισμός μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μέγεθος και σχήμα με αποστειρωμένο ψαλίδι.
Τοποθετήστε τον επίδεσμο στο τραύμα, διαμορφώστε τον και στερεώστε τον με κατάλληλη δευτερεύουσα κάλυψη (προϊόντα Suprasorb® F επίδεσμος φιλόλυο, Suprasorb® P επίδεσμος αφρού).
δ) Όταν χρησιμοποιείτε ο επιπωματισμός, διπλώστε τον πολλές φορές και εισαγάγετέ τον χαλαρά στο τραύμα. Μην γεμίστε πλήρως το τραύμα. Καλύψτε τον επιπωματισμό με κατάλληλο δευτερεύοντα επίδεσμο Suprasorb® F επίδεσμος φιλόλυο, Suprasorb® P επίδεσμος αφρού).

3. Αλλαγή επιδέσμου:
Το χρονικό διάστημα στο οποία πρέπει να αντικαθίστανται τα αντιμικροβιακά επιθέματα τραύματος/ επιπωματισμού Hydrofalinoe Suprasorb® X + PHMB καθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό, ανάλογα με την κατάσταση του τραύματος (με βάση τους διαθέσιμους κλινικές εμπειρίες καταδεικνύουν ένα διάστημα έως και 7 ημερών).
α) Αφαιρέστε το δευτερογενούς επίδεσμο.
β1) Αναασηκώστε προσεκτικά μια πλευρά του αντιμικροβιακού επιθέματος τραύματος Hydrofalinoe Suprasorb® X + PHMB και στη συνέχεια τραβήξτε προσεκτικά τον επίδεσμο απόσυρση σε ένα μέρος.
β2) Αφαιρέστε τραβώντας προσεκτικά τον αντιμικροβιακό επιπωματισμό Hydrofalinoe Suprasorb® X + PHMB από το τραύμα.
γ) Αφαιρέστε όλους τους δευτερογενούς τραύματος ή επιπωματισμού (μην τον επαναχρησιμοποιήσετε).
δ) Πριν την τοποθέτηση νέου επιδέσμου τραύματος ή επιπωματισμού, καθαρίστε το τραύμα.

Προφυλάξεις:
Απευθυνθείτε σε έναν ιατρό ή νοσοκόμο σε περίπτωση εμφάνισης των παρακάτω συμπτωμάτων:
- μεταβολή στο χρώμα και/ή στη μυρωδιά του τραύματος
- επιβράδυνση στην επούλωση του τραύματος
- κλινικά σημεία λοίμω