

## Mepilex® Border Post-Op

Selvkæbende kirurgisk bandage af blød silikone

### Produktbeskrivelse

Mepilex Border Post-Op er en selvkæbende bandage, der absorberer blodeksudat og minimerer risikoen for maceration. Det udvendige vandsætter sårret mod snas og bakterier. Bandagen har et Safetac® sårkontakttag, som er en unik klæbeteknologi. Det minimerer smerte hos patienterne og træume mod sårret og den omkringliggende hud ved bandageskift.

Mepilex Border Post-Op består af:

- En transparent filmbasiside, der er åndbar, men vandtæt, og som udgør en barriere over for udefra kommande urenheder
- Et fleksibel absorberende pude med to lag: Et nonwoven spredningslag og et lag med superabsorberende fibre
- Et sårkontakttag bestående af blød, selvklæbende silikone (Safetac) og et bærende lag af film

### Materialindhold:

Silikone, polyurethan, viskose, polyester, polyolefiner, polyakrylat og superabsorberende akrylfibre.

### Anvendelsesområde

Mepilex Border Post-Op er en selvkæbende, absorberende kirurgisk bandage, der er beregnet til akutte sår. Den er beregnet til akutte sår, såsom kirurgiske sår, snitsår og hudsksrabninger.

### Forholdsregler

- Hvis der iverktagtes tegn på infektion, f.eks. feber eller at sårret bliver rødt, varmt eller hævet, skal du kontakte sundhedsfagligt personale vedrørende passende behandling.
- Råder til at konsultere sundhedsfagligt personale før anvendelse af Mepilex Border Post-Op på patienter med epidermolysis bullosa.
- Mepilex Border Post-Op må ikke anvendes til patienter og/eller brugere med kendt overførsomhed over for de materialer/bestanddele, der indgår i produktet.



- Må ikke genanvendes. Hvis produktet genanvendes, kan det komme til at fungere dårligere, og der kan forekomme krydskontaminerings.
- Steril. Må ikke anvendes, hvis den indvendige emballage (sterile barriere) er beskadiget eller har været åbnet før brug. Må ikke restertiliseres.

### Brugervejledning

Mepilex Border Post-Op kan anvendes af lægerpersoner under sundhedsfagligt tilsyn.

1. Rens sårret og den omkringliggende hud i overensstemmelse med klinisk praksis.
2. Tør den omkringliggende hud grundigt.
3. Mepilex Border Post-Op sårpuden skal overlæppe såret med mindst 1-2 cm, således at den omkringliggende hud beskyttes mod maceration, og bandagen sidder godt fast.
4. For bandager med tre stykker bagsidefilm skal det midterste stykke bagsidefilm fjernes først. Sæt den klæbende side på såret, så bandagen kan fikseres. For bandager med to stykker bagsidefilm tages fat i begge stykker overlappende bagsidefilm, så klæbeoverfladen blottægges, og bandagen kan fikseres.
5. Undgå folder, mens de resterende stykker bagsidefilm forsigt fjernes. Begynd med den længste del. Stræk ikke bandagen under applicingen.

Mepilex Border Post-Op kan blive siddende i op til syv dage, afhængigt af sårets og den omkringliggende huds tilstand, eller i henhold til klinisk praksis.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse ned lokale miljømæssige procedurer.

### Andre oplysninger

Enhver alvorlig ulykke i forbindelse med Mepilex Border Post-Op skal rapporteres til Mölnlycke Health Care.

Mepilex® og Safetac® er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.