

Mepilex® Border med Safetac® teknologi

Selvklaædende skumbandage af blod stilcone

Produktbeskrivelse

Mepilex Border består af:

1. et såhkontaktlag af blod stilcone (Safetac®) på en polyuretanfilm
2. en fleksibel, absorberende pude i tre lag; polyuretanskum, et nonwoven spredningslag på viskose/polyester og et lag med superabsorbente polyakrylatibre
3. en ydre polyuretanfilm, der er åndbar og vandtæt

Safetac er en unik og patienteret klæbefølelse, der minimiserer smerte hos patienten og traume mod såret og den omkringliggende hud.

Mepilex Border er en meget formbar selvklæbende bandage, der absorberer væske, bevarer et fugtigt sårheilingsmiljø samt minimiserer risikoen for maceration.

Da Mepilex Border bevarer et fugtigt sårheilingsmiljø, som understøtter debridering,

kan den forekomme en øget sårstørrelsesinitialt. Det er normalt og kan forventes,

Anvendelsesområde

Mepilex Border er udviklet til en bred vifte af væskende sår, såsom tryksår, ben- og fodsår og traumatiske sår, f.eks. rifter og operationssår.

Mepilex Border kan også anvendes på torre/nekrotiske sår sammen med geler.

Mepilex Border kan bruges som led i en protylaktisk behandling, hvor produktet er med til at forhindre hudsæder, f.eks. tryksår, postoperativ bæredannelse.

Brugsanvisning

1. Rens såret efter normale procedurer.

2. Tør den omkringliggende hud grundigt.

3. Fjern beskyttelsespapiret, og applicér bandagen med den klæbende side mod såret. Stræk ikke bandagen.

4. For opnåelse af det bedste resultat skal Mepilex Border overlæppe den tørre omkringliggende hud med mindst 1-2 cm for de mindste størrelser (størrelser op til 12,5 x 12,5 cm) og 5 cm for de største størrelser med det formål at beskytte den omkringliggende hud mod maceration og at sikre bandagen sikker.



Mepilex Border kan blive siddende i flere dage afhængigt af sårets og den omkringliggende huds tilstand, eller hvad de kliniske retningslinjer anbefaler. I begyndelsen kan det være nødvendigt at skifte bandagen højpine, fordi en ændring i behandlingen kan resultere i en forøgelse af væske i starten.

Mepilex Border kan anvendes under kompressionsbandager.

Mepilex Border kan anvendes sammen med geler.

Forholdsregler

Bandagen må ikke anvendes på patienter med kendt overfølsomhed over for bandagen eller dens komponenter. I tilfælde af fejl på klinisk infektion bør du konsultere en læge og få en passende infektionsbehandling.

Anvend ikke Mepilex Border sammen med oxiderende midler som f.eks. hypochloritopløsninger eller hydrogenperoxid.

Brugen af bandager som led i en protylaktisk behandling udelukker ikke behovet for at fortsætte med at udvikle og følge en omfattende forebyggelsesprotokol for tryksår, dvs. statteoverflader, positionering, ernæring, hydrering, hudpleje og mobilitet.

Opbevaring og bortsættelse

Mepilex Border bør opbevares tørt ved temperaturer under 35 °C.

Bortsættelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljømæssige procedurer.

Andre oplysninger

Det polyuretanskum, der anvendes i produktet, kan skifte farve til en mere guttig farve, når det udsættes for lys, luft og/eller varme. Farveændringen har ingen indflydelse på produktets egenskaber, når det blot anvendes for udløbsdatoen.

Må ikke genbruges. Hvis produktet genanvendes, kan det begynde at fungere dårligt, og der kan forekomme krydskontamination.

Steril. Må ikke anvendes, hvis den individuelle emballage er beskadiget eller har været åbnet for anvendelsen. Vå ikke restisteres.

Hvis produktet anvendes efter udløbsdatoen, kan der ikke garanteres for produktgenskaberne.

Mepilex og Safetac er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB