

Medilax Lactulose, oral opløsn.

Beskrivelse

Medilax HF er en mikstur mod forstoppelse og træg mave, som også er velegnet ved kronisk forstoppelse. Medilax indeholder lactulose og virker ved at binde vand til tarmindholdet, så det svulmer op og stimulerer tarmens naturlige bevægelser. Medilax® (lactulose) er et afføringsmiddel, der kan benyttes ved forstoppelse. Medilax® (lactulose) kan endvidere benyttes ved Svære leversygdomme, hvor leveren ikke som normalt kan nedbryde alle de stoffer, der dannes i eller optages fra tarmen.

Læs indlægsseddelen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da denne indeholder vigtige oplysninger.



Ingredienser:

Lactulose og rensset vand

Indikation:

Tarmregulerende ved kronisk obstipation

Dosering:

Børn under 5 måneder: 3-6 ml daglig fordelt på 2 doser. Børn 5-12 måneder: 10 ml daglig fordelt på 1-2 doser. Børn 1-14 år: 5-15 ml daglig fordelt på 1-2 doser. Opløsningen gives til barnets afføring er blevet normal, sædvanligvis 7-10 dage, hvorefter dosis aftrappes over de følgende uger. Voksne og børn over 14 år: begyndelsesdosis 15-30 ml daglig. Efter virkning er opnået, nedsættes dosis til det halve. Hvis virkningen ikke indtræder i løbet af 3 dage, kan dosis fordobles. Dosis er individuel og bør justeres til halvfast afføring opnås. Kan tages uafhængigt af måltiderne.

Ved leversygdom bør begyndelses dosis fastsættes til 30 – 50 ml 3 gange i døgnet, hvorefter vedligeholdelsesdosisen fastsættes individuelt.

Kontraindikationer:

Gastrointestinal obstruktion. Akutte kirurgiske abdominale tilstande såsom akut appendicitis. Galactose intolerans. Overfølsomhed over for det aktive stof.

Advarsler og forsigtighedsregler: Medilax® (laktulose) Bør ikke indtages dagligt over længere perioder, da langvarig brug kan føre til vanedannelse og svækkelse af tarmfunktionen. Årsagen til obstipationen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for laksantia. Høje doser (100-150 ml daglig) kan øge insulinbehovet hos diabetikere. Bør ikke anvendes til patienter med fructoseintolerans, galactoseintolerans/galactosæmi, en særlig form for arvelig lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

Opbevaring: Utilgængeligt for børn og ved temperaturer over 25°C.

Holdbarhed: Se holdbarhedsdato på emballagen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Håndtering og destruktion: Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Indehaver af markedsføringstilladelse:
Meda A/S, Solvang 8, DK-3450 Allerød, Denmark

Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
301331	Medilax lactulose oral opløsn., 500ml flaske (dansk) HF	1/6	63661

Der tages forbehold for trykfejl (Marts 2018)