

# Ipren, smertestillende tabletter

## Beskrivelse

Smertestillende. Ipren tabletter a 200 mg (filmovertrukne) ibuprofen. Indeholder lactose.



## Farmakokinetik:

Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-2 timer. Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter. Plasmahalveringstiden er 1,5-2 timer. Ca. 1% udskilles uomodnet gennem nyrene.

## Indikationer:

Svage smerter.

## Doseringsforslag:

Voksne. 200-400 mg efter behov, højst 3 gange dgl.

## Graviditet:

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. For NSAID generelt er der påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser ved anvendelse i 1. trimester. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Ibuprofen har en veldokumenteret god sikkerhedsprofil og foretrækkes blandt NSAID.

## Amning:

Kan anvendes. Den relative vægtjusterede dosis er < 0,65%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos det ammede barn.

## Kontraindikationer:

Frisk gastro-intestinal blødning, sværere hjerte- og leverinsufficiens, svær hypertension, svær nyreinsufficiens og svær trombocytopeni. Asthma bronchiale eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

## Forsigtighedsregler:

Forsigtighed tilrådes ved hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne. Forsigtighed ved samtidig antikoagulationsbehandling.

## Bivirkninger:

Almindelige bivirkninger er: nedsat appetit, pyrosis, dyspepsi, kvalme, opkastning, abdominalsmerter, obstipation, perifere ødemer, hovedpine, svimmelhed, hududslæt og tinnitus.

**Forgiftning:**

Symptomerne er overvejende cerebrale: Svimmelhed, dysmotorik, synsforstyrrelser, i de sværeste tilfælde koma og kramper. Desuden gastro-intestinale symptomer med kvalme og opkastning. Lever-nyreskade er beskrevet. Dødsfald er forekommet. Doser på 100-700 mg/kg legemsvægt har hos børn og voksne (ud over de nævnte symptomer) medført acidose. Behandling: Symptomatisk.

**Interaktioner:**

Se nonsteroidie antiinflammatoriske midler (NSAID).

**Bloddonor:**

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

**Tilskud:**

Tilskudsberettiget til pensionister og ved kroniske smerter.

**Holdbarhed:** Se holdbarhedsdato på emballagen

**Håndtering og destruktio:** Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

**Udlevering:** HX

**Læs indlægsseddelen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da denne indeholder vigtige oplysninger.**

Produktinformationen er omskrevet/forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Nycomed Danmark ApS. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. [www.nycomed.dk](http://www.nycomed.dk). Indehaver af markedsføringstilladelsen: Nycomed Danmark ApS.

**Sortiment**

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
309852	Ipren tabletter, 200mg smertestillende HX	20 stk.	95307

Der tages forbehold for trykfejl (Marts 2018)