

# Panodil, smertestillende tabletter

## Beskrivelse

Panodil smertestillende tabletter a 500mg (filmoverttrukne - delekærn - mrk. Panodil).



## Farmakokinetik:

Absorberes næsten fuldstændigt (85- 90%) og meget hurtigt i den proximale del af tyndtarmen efter peroral indgift. Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-1 time. Absorptionen sker noget hurtigere efter indgift af brusetabletter, oral opløsning og oral suspension. Ved tilsætning af natriumhydrogencarbonat fordobles absorptions hastigheden af paracetamol. Terapeutisk plasmakoncentrationsområde for antipyretisk og analgetisk effekt er 65-130 mikromol/l (10-20 mg/l). Plasmahalveringstid 2-4 timer. Virkningsvarigheden er 4-6 timer efter peroral indgift. Paracetamol metaboliseres i leveren, hvor 80% konjugeres med glucuronid og sulfat og udskilles gennem nyrerne. Ved metaboliseringen dannes også en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI). Ved normal dosering inaktiveres NAPQI af glutathion i leveren. Ved overdosering af paracetamol øges produktionen af NAPQI, som dermed overstiger mængden af glutathion i leveren. NAPQI bindes i stedet til makroproteiner i levercellen, hvilket forårsager levercelleskade og levercellenekrose.

## Indikationer:

Svage smerter. Febernedsættende.

## Doseringsforslag:

Voksne. 0,5-1 g 3-4 gange dgl., højst 4 g i døgnet. Børn. 50 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 3-4 doser.

## Graviditet:

Kan anvendes i normale doser.

## Amning:

Udskilles i modermælk. Ved almindelig dosering får det ammede barn kun en lille mængde af stoffet, og der er herved ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. Plasmahalveringstiden for paracetamol er lang hos nyfødte og spædbørn.

**Kontraindikationer:**

Alvorlig lever- eller nyreinsufficiens. Pulvere til oral opløsning indeholder aspartam, der i organismen omdannes til phenylalanin. Denne dispenseringsform må derfor ikke anvendes til patienter med phenylketonuri (Føllings sygdom).

**Forsigtighedsregler:**

Kombinationsbehandling med dextropropoxyphen bør undgås på grund af øget risiko for alvorlige hjertebivirkninger ved overdosering.

**Bivirkninger:**

Stort set bivirkningsfrit i normale doser 0,5-1 g 3-4 gange dgl.

**Forgiftning:**

Se paracetamol på [www.medicin.dk](http://www.medicin.dk).

**Interaktioner:**

Paracetamol kan øge udskillelsen af lamotrigin og kan ved regelmæssig indtagelse i mere end 5 dage øge effekten af warfarin.

**Bloddonor:**

Må tappes.

**Holdbarhed:** Se holdbarhedsdato på emballagen

**Håndtering og destruktion:** Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

**Udlevering:** HX (kun 1 pakning pr. kunde pr. dag. Min. 18 år)

Produktinformationen er omskrevet/forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S. Indehaver af markedsføringstilladelsen: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S. Telefon 44 86 86 86.

**Læs indlægsseddelen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da denne indeholder vigtige oplysninger.**

**Sortiment**

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
309857	Panodil tabletter, 500mg smertestillende HX	10 stk.	005813

Der tages forbehold for trykfejl (Marts 2018)