

NUTRISON ADVANCED DIASON

Komplett sondeernæring med kostfiber spesielt tilpasset pasienter med diabetes eller nedsatt glukosetoleranse, og som har et normalt energibehov. Fri for melkeprotein. Glutenfri og laktosefri.

Nutrison Advanced Diason har en **energitetthet** på **1,03 kcal/ml**. Produktet er **ernæringsmessig komplett** og kan brukes som eneste kilde til ernæring.

Nutrison Advanced Diason er en spesiell sammensatt sondeløsning for pasienter med diabetes eller nedsatt glukosetoleranse. Hovedhensikten er å stabilisere blodsukker og samtidig forebygge senkomplikasjoner. Nutrison Advanced Diason har dokumentert gunstig effekt både på postprandiale blodsukkerstigning samt HbA1c verdier ¹.

Karbohydratandel er tapiokastivelse og litt fruktose. Nutrison Advanced Diason inneholder Nutricias patenterte og godt dokumenterte fiberblanding mf6™ som er en blanding av 6 ulike fiberkilder (3 løselige; akasiegummi, inulin, fruktooligosakkarider og 3 uløselige; soya-polysakkarider, resistent stivelse, cellulose). Studier har vist at denne fiberblandingen gir en bedret transittid og reduserer oppblåsthet², prebiotisk effekt – økt mengde bifidobakterier³, gir økt produksjon av kortkjedete fettsyrer⁴, reduserer forekomst av diare⁴ og reduserer forekomst av forstoppelse⁶. mf6™-blandingen består av 80% løselige og 20% uløselige fibrer. Løselig fiber er i studier vist å gi bedre blodsukkerkontroll hos prediabetes- og diabetes type 2 pasienter⁷.


Proteinkilden i Nutrison Advanced Diason er soyaprotein. Soyaprotein kan bidra til å redusere kolesterolet⁸. Fettet i Nutrison Advanced Diason består hovedsakelig av enumettet fett fra solsikke- og rapsolje (70 %) og har lavt innhold av mettet fett. Raps og solsikkeolje samt MCT fett bidrar til en gunstig fettsyresammensetning. Å erstatte mettet fett med enumettet fett kan være gunstig med hensyn på risiko for hjerte- og karsykdom⁹⁻¹¹.

BESTILLINGSINFORMASJON

	Bestillingsnr.	Varenr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Nutrison Advanced Diason	826111	632214	12 x 500 ml flaske
Nutrison Advanced Diason	591452	993168	8 x 1000 ml pakning



*1000 ml kommer i ny forpakning i 2019.



Protein:	100 % soyaprotein	FODMAP pr. 100 ml:
Kostfiber:	inulin, oligofruktose, akasiegummi, soyapolysakkarider, cellulose, resistent stivelse	Fruktose: 2,3 g
		Inulin: 0,623 g
		Akasiefiber: 0,249 g
		Oligofruktose: 0,373 g
Halalsertifisert:	ja	
Passer ved lakto- ovo-vegetarkost:	Ja	

NÆRINGSINNHold PR. 100 ML NUTRISON ADVANCED DIASON:

Energi					
	KJ	435	Jern	mg	1,6
	kcal	103	Sink	mg	1,2
			Kobber	mg	0,18
Fett (37 E%)	g	4,2	Mangan	mg	0,33
- hvorav mettede fettsyrer	g	0,5	Fluor	mg	0,10
-- MCT	g	-	Molybden	µg	10
- en-umettede fettsyrer	g	3,0	Selen	µg	7,5
- flerumettede fettsyrer	g	0,7	Krom	µg	12
-- herav linolsyre	g	0,61	Jod	µg	13
-- α-linolensyre	g	0,07			
-- DHA	mg	-	Vitaminer		
-- EPA	mg	-	Vitamin A	µg RE	82
Ratio n6:n3		8,5:1	Vitamin D ₃	µg	0,70
			Vitamin E	mg α-TE	2,5
Karbohydrat (43 E%)	g	11,3	Vitamin K	µg	5,3
- herav sukkerarter	g	2,3	Tiamin	mg	0,15
-- herav laktose	g	<0,006	Riboflavin	mg	0,16
			Niacin	mg NE	1,8
Kostfiber (3 E%)	g	1,5	Pantotensyre	mg	0,53
- løselig	g	1,2	Vitamin B ₆	mg	0,17
- uløselig	g	0,3	Folsyre	µg	38
			Vitamin B ₁₂	µg	0,50
Protein (17 E%)	g	4,3	Biotin	µg	4,0
			Vitamin C	mg	15
Salt	g	0,25			
			Annet		
Mineraler og sporstoffer			Karotenoider	mg	0,20
Natrium	mg (mmol)	100 (4,3)	Kolin	mg	37
Kalium	mg (mmol)	150 (3,8)	Vann	g	84
Klorid	mg (mmol)	125 (3,5)	Osmolaritet	mOsmol/l	300
Kalsium	mg (mmol)	80 (2,0)	Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	360
Fosfor	mg (mmol)	72 (2,3)	pH		7,2
Magnesium	mg (mmol)	23 (0,9)			

Ingredienser:

Vann, tapioca stivelse, **soyaprotein**, vegetabilske oljer (solsikkeolje, rapsolje), fruktose, kostfibre (inulin, oligofruktose, akasiegummi, **soyapolsakkarider**, cellulose, resistent stivelse), emulgator (**soyalecitin**), kaliumsitrat, natriumklorid, surhetsregulerende middel (sitronsyre), kaliumklorid, magnesiumkarbonat, trikalsiumfosfat, karotenoider (inneholder **soya**) (betakaroten, lutein, lykopenoleoresin fra tomat), kolinklorid, dikalsiumhydrogenfosfat, kalsiumhydroksid, natrium-L-askorbat, kaliumhydroksid, DL-α-tokolferylacetat, jernlaktat, sinkulfat, nikotinamid, retinylacetat, kromklorid, kobberglukonat, mangansulfat, kalsium-D-pantotenat, cyanokobalamin, natriumselenit, D-biotin, pteroylmonoglutaminsyre, kolekalsiferol, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, natriumfluorid, kaliumjodid, natriummolybdat, fytomenadion.

Inneholder per 100 ml

- 103 kcal
- 4,2 g fett fra solsikke- og rapsolje (37 E%)
- 11,3 g karbohydrater fra fruktose og stivelse (43 E%)
- 1,5 g kostfiber (3 E%)
- 4,3 g protein fra soyaprotein (17 E%)

Vitaminer og mineraler er tilsatt slik at 1500 ml (1545 kcal) dekker anbefalt daglig inntak.

Indikasjon:

Sondeernæring til kostbehandling av sykdomsrelatert underernæring hos pasienter med diabetes mellitus eller hyperglykemi, f.eks. ved nedsatt glukosetoleranse med et normalt energibehov.

Dosering:

Doseringen er individuell, og skal gjøres i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Ernæringsmessig komplett og kan brukes som eneste kilde til ernæring.

Kontraindikasjoner:

Pasienter som trenger en fiberfri diett. Spedbarn. Pasienter med galaktosemi og fruktoseintoleranse. Intoleranse mot et eller flere av produktets ingredienser.

Forsiktighetsregler:

Anvendes med forsiktighet til barn fra 1-6 år.

Administrasjon:

Enteral ernæringspumpe gir tryggest administrasjon. Ved bruk av gravitasjonssett bør Ch ≥8 brukes. Innholdet kontrolleres og ristes godt før bruk. Anvendes romtemperert.

Holdbarhet:

12 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato står på pakningen. **Hengetider:** Når flasken er tilkoblet ernæringssettet (aseptisk håndtert, lukket system), har den en hengetid på maks. 24 timer. Når korken tas av flasken (i et åpent system) har flasken en hengetid på maks. 8 timer. **Oppbevaring etter åpning:** Når flasken er åpnet (folie perforert og ernæringssettet fjernet), skal flasken lukkes og oppbevares i kjøleskap i maks. 24 timer.

Oppbevaring:

Lagres tørt og mellom 5-25°C.

Referanser: 1. Vaisman, N. et al. Clin Nutr 2008; 3 (Suppl 1): 125. 2. Silk DB, et al. Clin Nutr 2001;20(1):49-58. 3. Guimber D et al. Br J Nutr. 2010 104(10):1514-22. 4. Schneider SM, et al. Clin Nutr 2006;25(1):82-90. 5. Wiersman NJ, et al. Ned Tijdschr Dietisten 2001; 56:243-7. 6. Trier E, Wells JCK, Thomas AG. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;28(5):595 (Abstract). 7. Vaisman, N. et al. Clin Nutr 2006; 25: 897-905. 8. Anderson, JW et al. N Engl J Med, 1995;333(5):276-82. 9. Kris-Etherton, P.M et al. J Nutr. 1999;129(12):2280-4. 10. Mensink, R.P. et al. Am J Clin Nutr. 2003;77(5):1146-55. 11. Katan, M.B et al. Am J Clin Nutr. 1995;61(6 Suppl):1368-1373.

Nutricia produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

Nutricia Norge AS | Tlf. +47 23 00 21 00 | e-post nutricia@nutricia.no | web www.nutricia.no