

PROFORE[◊]

Applikeringsguide

PROFORE[◊]
Multi-Layer Compression
Bandage System

PROFORE[◊] #1

Naturlig polstret bandasje

Step 1



PROFORE #1 skal applikeres uten strekk. Start ved tåbasene, appliker forankring sirkulært rundt foten.

Step 2



Fortsett bak akillesenen.

Step 3



Sikre at hælen er fullstendig dekket.

Step 4



Start med 50 % overlapp med sirkulær tenikk. Fortsett oppover leggen til rett nedenfor kneet. Riv eller klipp av overflødig bandasje.

Step 5



Bruk ekstra lag for å forme rundt vristen for å hindre at bandasjen løsner hos pasienter med ulikt formede ben (f.eks. invertert champagne flaske).

PROFORE[◊] #2

Lett formende bandasje

Step 1



Start ved tåbasene, appliker to sirulære runder for å forankre.

Step 2



Fortsett med medium strekk, men hovedsakelig overfor hælen.

Step 3



Snu mellom fotbuen og undersiden av hælen for å lukke hælen.

Step 4



Ta en ny runde rundt forfoten og fortsett sirkulær applikering med 50 % overlapp oppover leggen.

Step 5



Avslutt rett på oversiden av Lag 1, fest med tape.

PROFORE[◊] #3

Lett kompresjons-bandasje

Step 1



Begynn ved tåbasene. Etter forankring av bandasjen, appliker en hællukking ved å bruke samme teknikk som for lag 2 (se illustrasjon over)

Step 2



Fortsett deretter med medium strekk på kryss over forfoten, med foten i 45° vinkel.

Step 3



Trekk bandasjen horisontalt og på kryss over akilles senen, deretter ned over forsiden av ankelen igjen og med foten i 45° vinkel.

Step 4



Fortsett oppover leggen med 8-talls teknikk, bruk den gule indikasjonslinjen til å sikre at 50 % overlapp oppnås.

Step 5



Avslutt rett på oversiden av Lag 2, fest med tape.

PROFORE[◊] #4

Fleksibel klebende bandage

Step 1



Start ved tåbasen. Appliker to runder rundt foten for å forankre bandasjen.

Step 2



Dekk til hælen med bandasjen med medium strekk, og hovedsakelig overfor hælen.

Step 3



Påfør bandasjen under fotsålen og appliker på tvers av foten for å hindre at bandasjen bygges opp på forsiden av ankelen.

Step 4



Start med sirkulær applikering med 50 % overlapp og fortsett oppover leggen til rett nedenfor kneet.

Step 5



Klipp av bandasjen, sikre at de siste 15 cm er uten strekk. Sikre med å presse forsiktig på bandasjen.

NB. Vær vennlig å referere til bestillingsinformasjonen for å sikre at korrekt bandasje er applikert på respektive ankelomkrets.

PROFORE[◊] Sett

Varenummer		Størrelse	PROFORE [◊] #1	PROFORE [◊] #2	PROFORE [◊] #3	PROFORE [◊] #4	WCL	PROFORE +
66000415	PROFORE [◊] LITE	All sizes	●	●		●	●	
66000770	PROFORE [◊] LITE - Latex-free	All sizes	●	●		●	●	
66000015	PROFORE [◊] small	< 18cm	●●	●	●	●	●	
66000016	PROFORE [◊] normal	18 - 25cm	●	●	●	●	●	
66000771	PROFORE [◊] normal - Latex-free	18 - 25cm	●	●	●	●	●	
66000017	PROFORE [◊] large	25 - 30cm	●			●	●	●
66000018	PROFORE [◊] extra large	> 30cm	●		●	●	●	●
66000701	PROFORE [◊] Sårkontaktlag	14 x 20 cm					●	

Referanse

1. Nelson EA et al. J Wound Care 1996; 5(2): 73-76

Wound Management

Smith & Nephew
Nye Vaks vei 64
1395 Hvalstad

norway@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com/wound

*Varemerke tilhører Smith & Nephew
© Smith & Nephew Juni 2012

T + 47 66 84 20 20
F + 47 66 84 20 90